# Rapport du suivi avifaunistique 2017 des Marais d'Harchies

© *Yves Fagniart*

Cette réalisation repose sur l'ensemble des données disponibles, qu'elles proviennent des contributeurs du groupe de travail « Marais d'Harchies » issus de la section AVES Mons-Tournai, de recensements exhaustifs plus individuels ou d'encodages sur le portail www.observations.be (voir la rubrique - **Remerciements** - en fin de rapport).

De la sorte, ce bilan annuel tente d'approcher au plus près l'avifaune des Marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul. Tout en essayant de mettre davantage en exergue la reproduction locale avec notamment un focus particulier sur les héronnières et cormorantières.

Une liste récapitulative des espèces observées de 1964 à nos jours termine ce rapport.

# Remarque liminaire

Conscients que ce rapport pourrait attiser des convoitises poussant à des velléités de transgresser l'interdit, nous rappelons que la partie Hensies des marais est strictement interdite à toute personne ne disposant pas d'une autorisation en bonne et due forme. Tout manquement sera sanctionné car ce respect est primordial pour la quiétude de cette réserve intégrale.

© *Yves Fagniart*

Etang d’Hensies vu de l’observatoire

# Nidification

**C**ette rubrique reprend l'ensemble des espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses (férales comprises) qui se sont établies dans le périmètre des marais ou à ses abords les plus immédiats. Que leur reproduction ait pu être prouvée ou pas, voire qu'elle puisse juste être envisageable au vu de certains comportements. D'autre part, celles qui l'étaient encore il y a peu ont également été intégrées de fait pour pouvoir commenter leur évolution locale.

**D**urant cette saison 2017, ce ne sont pas moins de 102 espèces qui peuvent être raisonnablement rangées dans cette catégorie.

- 73 certaines ;
- 17 probables ;
- 12 échecs & *al*.

## Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)

Environ 15 individus sont disséminés au maximum sur l'ensemble des étangs du site jusque fin mars. Hors nicheurs, la population locale augmente sensiblement par la suite pour atteindre des pics ponctuels, dont les plus importants sont par ordre croissant : 65 ind. le 10-06, 71 le 25-05, 79 le 09-07, 84 le 07-06, 92 le 23-07 et 94 le 24-06 (record de l'année).

Au-delà, hormis 14 oiseaux le 26-12, de 1 à 7 exemplaires se partagent la réserve de septembre jusqu'à la fin de l'année.

Si quelques comportements territoriaux, prolongés de poursuites, ont déjà été décelés auparavant, les liens entre couples formés se resserrent dès la dernière décade de février. Un premier nid est occupé à partir du 09-04 et les premiers pulli sont découverts le 07-06. Les trois nids construits et occupés sur Harchies (1 sur l'étang A et 2 sur l'étang B) s'avèrent finalement infructueux. Toutes les éclosions se concentrant dès lors sur Hensies.

Il y a finalement au moins 3 nichées prouvées sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve pour un total de minimum 10 pulli.

- 1 nichée de 5 pulli sur la partie « Pêche » de l'étang principal d'Hensies ;

- 1 nichée de 4 pulli sur la partie « Van Gheyt » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée d'au moins 1 pullus sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies.

## Oie cendrée (*Anser anser*)

Après des maxima importants en première période hivernale de 120 individus les 06 & 14-01 et 135 le 17-01, l'effectif retombe à une 30$^{aine}$ d'oiseaux à partir de la mi-février.

Des liens de plus en plus évidents reforment les couples potentiels durant la dernière décade de mars puis au-delà et les premiers pulli sont observés le 01-04.

Il y a finalement au moins 4 nichées prouvées sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve pour un total de minimum 24 pulli (soit un taux moyen de 6 juv./ nichée).

- 1 nichée de 2 pulli sur l'étang A d'Harchies ;
- 1 nichée de 5 pulli dans les prairies « Sartis », au pied du terril d'Hensies ;
- 2 nichées de respectivement 7 et 10 pulli sur la partie « Slabbinck » de l'étang principal d'Hensies.

A l'issue de la période de reproduction, la population locale (hors nicheurs) se stabilise en deux phases : une 70$^{aine}$ d'oiseaux à partir du mois d'août puis une 10$^{aine}$ de moins en novembre. Au moins 48 exemplaires sont encore vus le 18-12.

## Bernache du Canada (*Branta canadensis*)

Abstraction faite de quelques concentrations ponctuellement plus conséquentes, cette espèce férale ne semble toujours pas affectionner les marais au point de s'y concentrer en permanence. Comme cela s'avère être parfois le cas ailleurs. Après des maxima qui décroissent de 19 individus le 06-02 à 10 le 29-03, un premier accouplement intervient le 02-04 sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies. Issus d'une autre couvaison, les premiers pulli de l'année sont découverts le 03-05, toujours sur Hensies.

Il y a finalement au moins 2 nichées prouvées sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve pour un total de minimum 11 pulli. Voire une 3ème probable mais restée trop discrète pour être dénombrée. La réserve n'étant de la sorte guère plus saturée de reproducteurs.

- 1 nichée de 6 pulli sur la partie « Slabbinck » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée de 5 pulli sur la partie « Pêche » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée probable (non dénombrée) sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies.

L'automne qui s'installe amène de plus grands effectifs avec au maximum 82 oiseaux le 05-12.

## Ouette d'Egypte (*Alopochen aegyptiaca*)

Les Marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul semblent toujours relativement bien préservés de l'envahissement par cette espèce férale. Les effectifs y demeurant le plus souvent faibles et peu de nidifications étant initiées et, moins encore, menées à terme.

Si de 1 à 3 individus se partagent le site jusqu'à la mi-mars, une 20aine d'oiseaux au maximum y stationne jusque fin avril. Quelques couples semblent se former à partir de la dernière décade d'avril mais la seule reproduction prouvée intervient bien plus tard, en septembre.

Cette nichée de 4 grands jeunes non volants étant observée pour la première fois le 17-10 sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies.

Après 8 exemplaires le 06-11 puis 5 le 19-11, de 1 à 3 se répartissent à nouveau sur l'ensemble de ce vaste complexe marécageux jusque la fin de l'année.

## Canard colvert (*Anas platyrhnychos*)

L'étau hivernal se resserre en début d'année par des températures glaciales et des chutes de neige. Etalé sur plusieurs semaines, ce durcissement climatique provoque l'arrivée massive de l'espèce dont les concentrations atteignent 943 oiseaux le 06-01 et même 1313 le 21-01. Ils ne sont déjà plus que 403 le 27-01, lorsque la morsure des frimas se relâche.

Les liens entre futurs partenaires se tressent rapidement et, après des parades parcimonieuses ou peu renseignées, les couveuses se retirent en des criques et anses discrètes des roselières et autres recoins inextricables des marais.

La première nichée est découverte le 27-04. Il y en a finalement au moins 16 prouvées sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve pour un total de minimum 76 pulli (soit un taux moyen de 4,75 juv./nichée).

- 1 nichée de 5 pulli sur l'étang B d'Harchies ;
- 6 nichées de respectivement 3, 4, 4, 5, 6 et 7 pulli sur l'étang A d'Harchies ;
- 1 nichée de 3 pulli sur la partie « Slabbinck » de l'étang principal d'Hensies ;
- 2 nichées de respectivement 5 et 8 pulli sur la partie « Pêche » de l'étang principal d'Hensies ;
- 2 nichées de respectivement 2 et 4 pulli sur la partie « Mare à bihoreaux » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée de 5 pulli sur la partie « Van Gheyt » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée de 4 pulli sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies ;
- 1 nichée de 5 pulli sur l'étang frontalier « Van Hoecke » à Hensies ;
- 1 nichée de 6 pulli sur la partie inondée (ancienne peupleraie où pâturent les Galloways) entre ces étangs frontaliers « Van Damme » et « Van Hoecke ».

Les derniers jeunes de l'année à être clairement identifiés comme tels, le sont le 21-07.

La dernière décade de juillet marque le début de l'errance postnuptiale avec au maximum 200 individus le 26-07 puis le chiffre record de 1450 le 21-08. L'hivernage de l'espèce est peu mentionné en seconde période.

## Canard chipeau (*Mareca strepera*)

Les concentrations restent faibles en première période hivernale et un dernier pic de 69 individus intervient le 26-02. Par la suite, l'effectif local s'amenuise et les liens entre partenaires se renforcent par des parades, avant les premiers appariements. Ces couples résidents disséminés sur les divers étangs assistent aux haltes temporaires de migrateurs actifs qui perdurent tardivement cette saison (maximum 239 ind. le 25-06).

Après des couvaisons discrètes, voici venu le temps des éclosions. La première nichée est observée à partir du 28-05. Au moins 12 reproductions sont prouvées en 2017 sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve, pour un total de minimum 82 pulli (soit un taux moyen d'environ 7 juv./nichée).

- 6 nichées de respectivement 5, 7, 7, 9, 9 et 10 pulli sur l'étang A d'Harchies ;
- 1 nichée de 8 pulli sur la partie « Slabbinck » de l'étang principal d'Hensies ;
- 2 nichées de respectivement 5 et 6 pulli sur la partie « Pêche » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée de 6 pulli sur la partie « Mare à bihoreaux » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée de 9 pulli sur la partie « Van Gheyt » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée d'au moins 1 pullus sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies.

De moins en moins différentiables de leurs géniteurs, de jeunes oiseaux nés sur le site sont mentionnés pour la dernière fois le 17-07. La dispersion postnuptiale draine un important contingent d'oiseaux (250 ind. le 26-07) qui, pour la plupart, quitteront assez vite les lieux pour continuer leur voyage. La fréquentation des marais devenant bien moindre par la suite avec des maxima de 136 exemplaires le 11-09, 137 le 17-12 et 174 le 27-12.

## Canard souchet (*Spatula clypeata*)

Aucune reproduction n'a malheureusement pu être prouvée cette saison.

En première période hivernale, l'effectif semble stable et oscille peu avec au maximum 120 individus jusque fin février. Les mouvements migratoires deviennent ensuite de plus en plus perceptibles jusqu'au pic de 505 oiseaux qui intervient le 25-03. Le besoin irrépressible de rejoindre les zones de reproduction lamine toujours davantage la population des marais, qui décroît progressivement : 150 le 10-04, 50 le 22-04, 15 le 07-05 et 11 le 25-06.



Si une légère remontée (30aine d'ind. en dernière décade d'août) met faiblement en lumière la dispersion postnuptiale de l'espèce en nos contrées, il faut attendre un bon mois supplémentaire pour qu'elle devienne enfin éclatante. Le record de présence de l'année 2017 étant atteint le 04-10 suite au comptage de 510 exemplaires.

Par la suite, l'effectif se stabilise aux alentours de 350 individus jusque la fin de l'année : +/-350 le 30-11, 369 le 18-12 et toujours 358 le 27-12.

## Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)

Jusqu'en première décade d'octobre, la population locale de cet anatidé atteint tout au plus une 40aine d'oiseaux. Durant la période propice à sa reproduction, l'effectif semble se stabiliser à 12-13 nicheurs potentiels, de la dernière décade d'avril à la mi-juillet. Mais avec 8 données collectées en avril, aucune en mai et seulement 3 en juin, la discrétion de ce petit noyau semble avoir été totale. Pour peu que ces possibles résidents soient restés à demeure. L'extrême méfiance des ♀, lorsqu'elles sont accompagnées de leur progéniture, accentue la difficulté de détecter une famille. Raison pour laquelle, une seule nichée tardive de 6 pulli est finalement repérée le 16-08 sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies.

La dispersion postnuptiale est faiblement perceptible à partir du 23-07 (20 ind.) puis davantage au-delà du 12-08 (45 ind.), sans jamais devenir importante. A partir de la seconde décade d'octobre, les hivernants qui commencent à s'installer permettent enfin à l'effectif local de grimper progressivement jusqu'aux maxima de 284 oiseaux le 17-12 (record de l'année) et toujours 279 le 27-12.

## Sarcelle d'été (*Spatula querquedula*)

Aucune reproduction n'a pu être prouvée cette saison.

Les 6 premières (4♂ & 2♀) de l'année sont de retour le 10-03. Comme de coutume, l'espèce ne sera par la suite observée que ponctuellement, au gré de déambulations locales ou d'arrivées aléatoires de migrateurs qui prolongent ou non leur halte.

La présence de deux couples le 08-04 puis la détection très irrégulière de 1 à 2 ♂ jusqu'au moins le 18-06 (1 contact en mai et 3 en juin) pourrait laisser présumer que, peut-être, l'une ou l'autre ♀ s'est remisée discrètement sur son nid. Malheureusement, cette reproduction ne semble pas s'être concrétisée mais la prudence des mères qui évitent de mettre leurs rejetons, proies faciles, en des endroits trop à découverts ne facilite pas une telle détection.

La dispersion postnuptiale est mise en évidence à partir du 12-08 suite à l'arrivée de 13 individus et 21 le lendemain. Par la suite, l'effectif s'amenuise au gré des départs : 10 oiseaux le 26-08, 9 le 27-08, 3 le 03-09 et le dernier le 08-09. Un ultime migrateur tardif s'arrête brièvement le 04-10.

## Fuligule milouin (*Aythya ferina*)

Bien que les effectifs soient élevés en hiver, tant en première qu'en seconde période (max. 310 ind. le 18-12), l'erratisme postnuptial en draine, paradoxalement, bien plus encore. Comme cela est détaillé ci-dessous.

Après le départ massif des derniers hivernants ou migrateurs en halte, la population locale est estimée à une bonne 20aine d'oiseaux aux premiers jours d'avril. Ces résidents ♂ forment à ce moment des couples plus assurés, après avoir paradé auprès des ♀ restées à leurs côtés.

De phénologie similaire à son proche cousin, le Fuligule morillon (*Aythya fuligula*), la première nichée est découverte plus tardivement encore (le 23-06). Il y en a

finalement au moins 4 prouvées sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve pour un total de minimum 11 pulli (soit un faible taux moyen de 2,75 juv./nichée).

- 1 nichée d'un seul pullus sur la partie « Slabbinck » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée de 4 pulli sur la partie « Pêche » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée d'un seul pullus sur la partie « Mare à bihoreaux » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée de 5 pulli sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies.

La dispersion postnuptiale intervient rapidement car 110 individus (nicheurs compris) fréquentent déjà les étangs de la réserve le 01-06. Ils semblent affectionner les lieux, à moins que leur déferlement soit bien plus considérable, car leur accumulation atteint progressivement 273 exemplaires le 25-06 et 354 le 08-07 (record de l'année 2017). Une autre interprétation de cette hâtive concentration, au cœur même de la période de nidification propre à l'espèce, est beaucoup plus alarmante. En effet, les ♀ présentent à ce moment pourraient témoigner de l'échec vraisemblable de leurs tentatives de reproduction. Tout cela accréditant peut-être la mauvaise santé actuelle des populations de l'espèce ?

A l'issue de cette période aux mouvements fréquents et avant l'arrivage des fuyards climatiques en décembre, l'effectif local se stabilise à +/-200 individus de septembre à novembre.

## Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)

Typiquement, les maxima sont notés lors des périodes les plus froides de l'année avec 133 individus le 06-01 puis 131 le 17-12-2017. Entre ces deux pics de présence, l'effectif fluctue sans cesse selon les arrivées et départs. Davantage encore au retour des beaux jours, lorsque le besoin vital de rejoindre sans plus tarder les zones de reproduction se fait plus prégnant ou, à l'inverse, lors de l'erratisme postnuptial.

Après une dernière faible concentration de 52 oiseaux le 02-04, l'espèce se fait plus discrète et les couples se forment. Il n'est alors pas si rare de voir des ♂ parader auprès de leurs belles, sur les étangs ou en vol, et d'entendre leurs cris d'excitation si particuliers.

Fidèle à la phénologie de l'espèce, la première nichée est visible à partir du 10-06, soit plus tardivement que celles des autres anatidés. Il y en a finalement au moins 9 prouvées sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve pour un total de minimum 49 pulli (soit un taux moyen d'environ 5,5 juv./nichée).

- 1 nichée de 5 pulli sur l'étang A d'Harchies ;
- 2 nichées de respectivement 5 et 8 pulli sur la partie « Slabbinck » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée de 8 pulli sur la partie « Pêche » de l'étang principal d'Hensies ;
- 3 nichées de respectivement 4, 5 et 6 pulli sur la partie « Mare à bihoreaux » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée de 3 pulli sur la partie « Van Gheyt » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée de 5 pulli sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies.

## Perdrix grise (*Perdix perdix*)

Quelques individus fréquentent les secteurs agricoles qui ceinturent la réserve, sans que les données récoltées ne puissent préciser s'il y a eu nidification locale ou non. Les prairies et champs « Sartis », au niveau des bâtiments CRIE/DEMNA et des fermes au-delà, semblent plus attractifs. A moins que la pression observationnelle y soit plus conséquente (proximité du parking). Après 4 ♂ et 1 ♀ observés le 18-03, un couple y est revu à 3 reprises jusqu'au 09-07. Le dernier contact de l'année intervient le 28-07.

## Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*)

La découverte d'un petit pullus le 31-07 en bordure du chemin des Maillettes atteste de la reproduction locale de l'espèce.

## Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)

Après une absence de plus de deux mois (depuis le 04-12-2016), les 3 premiers individus de l'année sont observés le 14-02. Parmi lesquels un couple se forme assez vite et parade déjà le 21-02. L'effectif local augmente sensiblement le mois suivant au gré des arrivées régulières : 4 oiseaux le 03, 12 le 05, 16 le 11, 24 le 12, 33 le

15, 36 le 21 et 94 les 25-03 & 01-04. Ces derniers étant en grande partie des migrateurs en halte qui finirent par reprendre leur route.

La première construction de nid intervient le 05-03 sur l'étang A d'Harchies. Si 2 nids sont occupés sur cet étang A d'Harchies et 2 autres sur la partie « Van Gheyt » de l'étang principal d'Hensies, les portions « Slabbinck » et « Pêche » de ce dernier hébergent la toute grande majorité des nids dont très peu s'avèreront fructueux.

Des 38 oiseaux qui paradent là le 29-05, la plupart forment déjà des couples et construisent ou occupent des nids le 02-06 dont un contient déjà des œufs le 03-06. Tous couvant à cet endroit le 07-06 (19 nids occupés). Leur disparition subite occasionne la reconstruction d'au moins 17 nids dans cette même zone de l'étang principal d'Hensies dont seulement 5 découleront avec certitude sur des naissances de respectivement 1, 1, 2, 2 et 3 pulli (soit un taux moyen sur ce faible échantillonnage de 1,8 juv./nichée). La réussite des couvaisons excentrées par rapport à ce noyau (2 sur l'étang A d'Harchies et 2 sur la partie « Van Gheyt ») ne peut malheureusement être confirmée.

Comme souvent, beaucoup d'oiseaux s'installent mais peu réussissent leur reproduction.

Par la suite, les observations mentionnent des effectifs bien moindres car probablement plus disséminés sur l'ensemble des marais. Et, hormis 8 individus le 11-10, ce sont de 1 à 3 oiseaux qui errent sur le site jusqu'au 28-10, guère au-delà.

## Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)

Plus petit, en recherche constante de nourriture, en des criques retirées à l'arrière des roselières, ce grèbe n'est assurément pas toujours facile à observer. A l'inverse, sa défense territoriale fait appel à des ricanements puissants, émis souvent à deux voix. Il est dès lors plus facile à comptabiliser à l'oreille à la sortie de l'hiver, lorsqu'il entreprend de conquérir le cœur de sa belle, tout en veillant à s'approprier un petit coin discret des marais.



De cette manière, les premiers cantonnements sont décelés le 26-02 et de plus en plus intensément à partir du mois de mars. Au moins 39 cantons certains ont

finalement été découverts et 10 naissances prouvées sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve.

Ces 39 cantons certains se répartissent comme suit :

- 1 sur l'étang de Pommeroeul ;
- 1 sur le « Grand Courant » (au niveau de la passerelle à Pommeroeul) ;
- 7 sur l'étang A d'Harchies ;
- 5 sur l'étang B d'Harchies ;
- 4 sur la partie « Pêche » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 sur la partie « Mare à bihoreaux » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 sur la partie « Van Gheyt » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 sur l'étang des grandes vasières à Hensies ;
- 1 sur l'étang des petites vasières (« Najas ») à Hensies ;
- 2 sur les « Mares à tritons » à Hensies ;
- 1 sur la zone humide de la « Pompe brûlée » à Hensies ;
- 5 sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies ;
- 5 sur l'étang frontalier « Van Hoecke » à Hensies ;
- 4 dans la zone inondée (partie de l'ancienne peupleraie) entre les 2 étangs précités ;

La première éclosion intervient un peu avant le 19-05 et les 10 reproductions prouvées totalisent au moins 20 pulli (soit un taux moyen de 2 juv./nichée) :

- 2 nichées de respectivement 1 et 2 pulli sur l'étang A d'Harchies ;
- 1 nichée de 4 pulli sur la partie « Slabbinck » de l'étang principal d'Hensies ;
- 3 nichées de respectivement 1, 2 et 2 pulli sur la partie « Pêche » de l'étang principal d'Hensies ;
- 2 nichées de respectivement 1 et 2 pulli sur la partie « Mare à bihoreaux » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée de 2 pulli sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies ;
- 1 nichée de 3 pulli sur l'étang frontalier « Van Hoecke » à Hensies.

Par la suite, seules deux données témoignent de façon irréfutable de l'arrivage d'oiseaux en errance postnuptiale : 56 individus le 09-07 et 67 le lendemain. Des hivernants s'installeront plus tard mais leur éparpillement sur l'ensemble des marais et leur relative discrétion ne permettent pas de dresser un bilan exhaustif de leur stationnement.

## Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)

Après quelques prémices les 17 et 19-02, les parades nuptiales se généralisent à partir du mois de mars. Ces comportements renforcent les liens entre partenaires et des couples sont alors observés un peu partout au sein des marais, en des endroits favorables à l'établissement des nids dont les premiers sont découverts le 16-05.

Les premiers pulli sont contactés à partir du 10-06 mais il faut attendre juillet pour que les naissances s'intensifient. Au moins 23 reproductions sont prouvées en 2017 sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve, pour un total de minimum 56 pulli (soit un taux moyen d'environ 2,43 juv./nichée).

- 1 nichée de 3 pulli sur l'étang de Pommeroeul ;
- 3 nichées de respectivement 1, 2 et 3 pulli sur l'étang A d'Harchies ;
- 4 nichées de 2, 3, 4 et 5 pulli sur l'étang B d'Harchies ;
- 3 nichées de respectivement 1, 2 et 3 pulli sur la partie « Slabbinck » de l'étang principal d'Hensies ;
- 3 nichées de respectivement 2, 2 et 3 pulli sur la partie « Pêche » de l'étang principal d'Hensies ;
- 4 nichées de respectivement 1, 3, 4 et 4 pulli sur la partie « Mare à bihoreaux » de l'étang principal d'Hensies ;
- 2 nichées de respectivement 1 pullus chacune sur la partie « Van Gheyt » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 nichée de 2 pulli sur l'étang des petites vasières (« Najas ») à Hensies ;
- 2 nichées de respectivement 2 pulli chacune sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies.

Nés tardivement, comme de coutume, ces petits accueilleront le retour de leurs parents de puissants cris plaintifs jusqu'au cœur de l'automne. Leur émancipation progressive ramènera un peu de quiétude sur les marais.

Outre quelques possibles premiers frémissements, la dispersion postnuptiale est mise en lumière de manière éclatante le 03-09 avec l'arrivée d'une 100$^{aine}$ de migrateurs en halte. Après un maximum de 114 individus atteint le lendemain (04-09) sur les étangs A et B d'Harchies, l'effectif journalier est moindre mais fluctuant en fonction de la minutie des comptages renseignés. Les maxima ponctuels semblent néanmoins dégressifs et atteignent : 91 ind. le 28-09, 81 le 08-10, 66 le 03-11 et 46 le 07-11. Par la suite, hormis 16 hivernants le 17-12 et 38 le 25-12, les données s'étiolent car les oiseaux semblent plus dispersés sur l'ensemble des marais.

## Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Les dortoirs d'Hensies accueillent 386 individus le 14-01, qui côtoient les couples nicheurs déjà installés. Le premier comptage aux colonies qui intervient le 26-02 confirme un nombre élevé de nids occupés et prouve, de la sorte, le maintien d'une phénologie hâtive pour la reproduction locale de l'espèce. Les premiers nids étant souvent réinvestis vers la fin-décembre.

Les trois cormorantières d'Hensies totalisent au minimum 207 nids qui se répartissent comme suit :

- 87 nids dans la saulaie « Van Damme » (dont 4 dans la héronnière proprement dite !)
- 117 nids dans l'aulnaie « Van Damme ».
- 3 nids seulement à l'interface de la grande peupleraie « Macau » (colonie qui n'a cessé de péricliter depuis son maximum de 110 nids atteint en 2005).

Ce total définitif de minimum 207 nids permet à l'espèce de renouer avec une certaine stabilité après la chute à 180 nids survenue l'année précédente (càd le plus faible effectif depuis 2002).

Déjà perceptibles lors du passage prénuptial avec au total 73 oiseaux en vol vers le NE du 29-03 au 20-04, les mouvements migratoires le sont davantage encore en automne avec au total 204 voyageurs en vol vers le SW du 19 au 31-10.

Après un pic de 554 exemplaires le 11-09, parmi lesquels doivent encore être bien représentés les géniteurs locaux et leurs rejetons, les dortoirs accueillent de faibles contingents d'hivernants (donc certains ne tarderont pas à entamer une nouvelle saison de reproduction) : 248 le 04-11 et 203 le 26-12.

## Butor étoilé (*Botaurus stellaris*) :

Comme souvent, lorsque les niveaux d'eau sont bas, les roselières qui ceinturent l'étang de Pommeroeul offrent aux hivernants garde-mangers et bains de soleil. Les concentrations notées essentiellement à cet endroit des marais enregistrent

des maxima de 4 à 5 individus jusqu'au 06-01 puis 1 à 2 (plus rarement 3) jusqu'à la mi-février.

Déjà forts bas à l'entame de la saison de nidification, les niveaux n'ont cessé de descendre par la suite, rendant les biotopes inadéquats pour répondre aux besoins vitaux de l'espèce. Il n'y a donc eu aucune reproduction locale. La seule donnée de cette période relate l'envol d'un oiseau le 15-06 dans la vaste roselière de Pommeroeul.

Hormis 6 individus (record de l'année) le 11-11, de 1 à 3 Butors sont souvent observés à partir du 18-10 jusque fin novembre, lorsqu'ils prennent position en lisière de phragmitaie ou plus en hauteur sur des touffes de roseaux (étang de Pommeroeul). Puis de 1 à 3 plus irrégulièrement en décembre.

## Blongios nain (*Ixobrychus minutus*) :

Les rares données ont toutes été obtenues lors du passage prénuptial :

- Un ♂ est surpris en vol le 07-05 à l'extrémité de la digue A/B (Harchies).
- Une ♀ est observée le 15-05 sur la partie « Van Gheyt » à Hensies (au niveau de la palissade de bois) puis un peu plus loin sur ce même étang.
- Un ♂ chanteur est entendu le 30-05 à l'extrémité droite de l'aulnaie « Van Damme » (Hensies).

Dès lors, la nidification de ce petit ardéidé n'a pu être constatée cette saison. Comme cela est le cas depuis de nombreuses années, un recensement ciblé de cette espèce discrète n'a plus été organisé, guère plus coordonné. Les totaux obtenus à une certaine époque (jusqu'au début des années 2000) étaient impressionnants, certes, mais surtout rendus possibles par la focalisation de Paul Skinner sur ce lilliputien parmi les hérons.

## Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)

Après plus de 3 mois d'absence, un adulte et un juvénile s'étant maintenus jusqu'au 29-12-2016, le premier contact de l'année 2017 intervient le 10-04 (un adulte) dans la héronnière « Van Damme » à Hensies, où viennent discrètement s'installer plusieurs familles.

Leurs nids sont difficilement visibles et, de facto, quantifiables avec certitude. Néanmoins, des transports de matériaux concernent au minimum 2 nids à partir du 22-04. Mais les 6 adultes en plumages

nuptiaux observés ce même jour laissent entrevoir la possibilité qu'un 3ème nid ait été occupé. Tout cela étant confirmé durant la dernière décade de juin. En effet, après une première observation d'un pullus le 24-06, ce sont 2 nichées distinctes (1 + 3 pulli) qui sont détectées le lendemain (25-06).

Le bilan de nidification 2017 de cette espèce discrète est donc de 2 reproductions certaines (de 1 et 3 juv.) et d'une possible 3ème.

Par la suite, de 1 à 4 individus fréquentent l'ensemble des marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul jusqu'en fin d'année, au moins.

## Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*)

Alors qu'ils étaient encore 26 individus le 09-12-2016, l'effectif des hivernants s'amenuise dès janvier face aux conditions climatiques qui se durcissent. Ils ne sont plus que 10 les 12 & 13-01, 3 le 19-01 et plus aucun au-delà.

Après un peu plus de deux mois d'absence, une première observation intervient le 23-03 sur Harchies et un premier adulte en plumage nuptial est contacté le 02-04 au sein de la héronnière « Van Damme » à Hensies, où tout s'enchaîne ensuite assez vite. Un premier nid y est couvé à partir du 22-04, un second à partir du 29-04 et un 3ème à partir du 11-05. Le premier pullus est découvert le 10-06.

En conclusion, la façade avant de cette saulaie « Van Damme » accueille au moins 3 nids qui contiennent de 2 à 3 pulli. Mais une très forte activité à l'arrière (en des endroits discrets et impossibles à voir, même de l'étang « Van Hoecke ») couplée à un nombre important d'oiseaux (max. 17 le 22-04 et toujours 15 le 13-05) laissent entrevoir la possibilité de quelques nids supplémentaires non quantifiables.

Après l'émancipation des jeunes, un dernier exemplaire est noté le 18-11.

## Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)

Seuls à même de mettre en lumière l'effectif réel qui stationne à un moment donné sur les marais, les comptages aux dortoirs sont de 14 individus les 12 et 13-01, 9 le 18-01, 4 les 19 et 26-01, 6 le 08-02 et 19 le 24-02. Par la suite, les nicheurs potentiels se concentrent dans ou aux abords de la héronnière de l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies.

Après un premier accouplement le 02-04 puis un transport de matériaux le 09-04, une première couvaison intervient le 10-04.

Cette saulaie « Van Damme » accueille la majorité des nicheurs qui s'y installent principalement à l'arrière, en des endroits difficilement visibles (même depuis l'étang « Van Hoecke »). Néanmoins, une estimation minimale permet de prendre en compte la couvaison d'au moins 25 nids. Cette appréciation apparaissant d'autant plus raisonnable, si l'on se base sur le nombre d'adultes revêtus d'un plumage nuptial, ponctuellement notés : une 40 aine le 11-04 et encore 35 le 22-04 (de retour en soirée, essentiellement de France) et même un record de 67 (dont les 6 couveuses installées à l'avant) obtenu le 13-05, alors que les départs vers la France se succèdent à l'aube.

Par ailleurs, la façade avant de cette saulaie « Van Damme » héberge au minimum 6 nids qui, plus visibles que ceux implantés à l'arrière, sont parfaitement inventoriés pour 5 d'entre eux :

- 1 nid de 4 pulli.
- 1 nid de 3 pulli.
- 1 nid de 2 pulli.
- 2 nids proches pour un total de 7 pulli.

Les éclosions démarrent là à partir du 11-05 et ces 16 juvéniles déambulent déjà à l'avant de cette saulaie basse le 30-05. D'autre part, fait saillant, 3 nids sont occupés (dont un par 2 pulli) dans l'aulnaie « Van Damme ».

Il n'est donc pas invraisemblable d'évoquer +/-25 nids occupés au sein de ces deux héronnières réunies pour cette saison de nidification 2017. Voire davantage encore, si l'on se réfère au nombre d'adultes en plumage nuptial (minimum 67 individus) observés en pleine période de reproduction (le 13-05).

L'automne revenu, les recensements aux dortoirs apportent des maxima dégressifs de 56 oiseaux le 27-09, 47 le 08-10, 36 le 26-10 et 27 le 06-11. Un seul d'entre eux se maintient sur les marais en décembre.

## Grande Aigrette (*Ardea alba*)

Les dortoirs accueillent une 40$^{aine}$ d'individus au moins jusqu'au 19-01 puis, hormis 26 seulement le 01-02, davantage encore avec 58 exemplaires le 08-02 et 53 le 24-02.

Un premier nid semble déjà occupé le 23-03 dans la héronnière « Van Damme » à Hensies et des adultes revêtus de plumages totalement nuptiaux (tarses rouges compris) y sont progressivement observés à partir de la dernière décade d'avril pour atteindre au minimum 4 individus le 11-05 (mais probablement 2 de plus). Un vol de parade entre partenaires se prolonge le 03-04 aux quatre coins de cet étang frontalier.

Au moins 2 nids sont couvés, ainsi qu'un 3$^{ème}$ plus que vraisemblablement à partir du 02-04. Occupé par un couple composé d'un adulte en PN et d'un adulte en plumage partiellement nuptial, ce dernier n'a peut-être finalement pas accueilli une couvée viable.

Aucune observation de pulli n'a malheureusement permis de confirmer la réussite de ces nichées. Les nids étant implantés très discrètement à l'arrière et en contrebas de la héronnière « Van Damme » (visibles très difficilement même par l'arrière, du côté de l'étang « Van Hoecke »).

Une fois encore, les dénombrements aux dortoirs sont les plus à même d'apporter la meilleure quantification des effectifs présents sur les marais : 14 oiseaux le 09-09, 30 le 28-09, 42 le 07-10, 54 le 08-10 et 43 le 27-12.

## Héron cendré (*Ardea cinerea*)

Tant en première, qu'en seconde période hivernale, une 10aine d'oiseaux tout au plus semblent stationner sur les marais. Les premières couvaisons interviennent tôt car 18 nids sont déjà occupés lors d'un premier recensement aux colonies le 26-02. Les premiers pulli sont d'ailleurs contactés à partir du 30-03.

Au moins 105 nids sont occupés dans les 3 héronnières distinctes implantées maintenant sur Hensies (soit une supplémentaire). En effet, le fait majeur de cette saison de reproduction 2017 étant l'installation d'une nouvelle colonie au sein de la saulaie basse qui borde l'étang frontalier « Van Hoecke ».

- Environ 90 nids (dont une 20aine à l'arrière) dans la saulaie « Van Damme ».
- Minimum 7 nids dans l'aulnaie « Van Damme ».
- Minimum 8 nids dans la saulaie « Van Hoecke »

Ce total de 105 nids est un minimum car une large partie de l'arrière de la saulaie « Van Damme » demeure invisible, même depuis le chemin frontière ou la prairie aux galloways. Les quelques nicheurs potentiellement installés là pourraient faire remonter très légèrement ce taux d'occupation. Sans que leur non-détection constitue en soit un biais conséquent.

Par la suite, hormis 19 individus signalés le 11-10, les oiseaux sont à ce point disséminés sur l'ensemble des marais, qu'il est difficile d'appréhender leur nombre exact. Mais, quoiqu'il en soit, quelques-uns semblent hiverner.

## Spatule blanche (*Platalea leucorodia*)

La première observation de l'année intervient le 13-03 et les prémices d'une première installation dans la héronnière de l'étang « Van Damme » à Hensies sont déjà décelables le 23-03. Suite au comportement adopté par ce qui semble être un couple formé, qui s'évertue à arranger des branches sur un nid existant et abandonné (probablement celui d'un Héron cendré).

Une parade au nid est observée les 20-04 et 07-05, une première couvaison intervient à partir du 22-04 et les 3 premiers pulli sont vus dès le 04-07.

Après compilation de l'ensemble des données collectées, l'estimation est d'au moins 3 nids occupés à l'arrière de la saulaie « Van Damme » (dont 2 certains avec respectivement 3 pulli chacun). Ce qu'accrédite l'observation réalisée le 31-07 sur l'étang B d'Harchies avec la présence de 6 juvéniles de l'année parmi un groupe de 9 adultes.

A l'envol des jeunes, ces familles quittent la colonie à partir de la mi-juillet et sont observées en divers endroits des marais lorsqu'elles s'alimentent. Elles sont rejointes par les premiers migrateurs en halte à partir du 31-07. Hormis 19 individus le 07-08 (record de l'année), ces nouveaux visiteurs font progressivement grimper l'effectif local jusqu'à un maximum de 16 à 17 oiseaux, qui fluctue peu, du 05-08 à la mi-septembre. Les départs qui s'initient alors éclaircissent ce groupe qui passe de 11 exemplaires le 16-09 à 10 le lendemain puis seulement 1 à 2 jusqu'au 12-10. L'ultime spatule de l'année demeurant une semaine supplémentaire avant de définitivement quitter les lieux au-delà du 18-10.

## Milan noir (*Milvus migrans*)

Première pour le site, un couple construit un nid et entame une couvaison en bordure du chemin des « Sartis » à Hensies, qui mène à l'observatoire de l'étang frontalier « Van Damme ». Pour lui garantir le calme nécessaire, plus aucun passage n'a été autorisé via ce chemin jusqu'à ce qu'il devienne évident que cette tentative soit un échec.

## Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)

Un immature et une ♀ sont observés à 3 reprises du 19-01 au 23-02. Par la suite, les contacts s'intensifient et il n'est pas toujours évident de faire le tri entre futurs résidents et migrateurs en halte.

Une première parade intervient entre 3 ♂ et 1 ♀ le 15-04. Elle sera finalement suivie de peu d'autres comportements nuptiaux. Signes que les niveaux d'eau excessivement bas de ce printemps ont rendu peu attractifs les habitats habituels.

Une reproduction est tentée et menée à bien dans la roselière de Pommeroeul, selon la phénologie suivante : parade aérienne le 13-04, construction du nid le 21-04 et émergence de 4 pulli le 17-07.

Par la suite, mâles, femelles et immatures sont constamment présents sur l'ensemble des marais jusqu'octobre. Un peu plus d'un mois sépare la présence d'une ♀ en première décade de novembre, de celle d'un ♂ en seconde 15$^{aine}$ de décembre.

## Buse variable (*Buteo buteo*)

Espèce commune toute l'année sur l'ensemble des marais, une reproduction certaine a eu lieu dans la petite peupleraie « Macau » sur Harchies et deux autres, probables, sur le terril d'Hensies, ainsi qu'aux abords de l'étang « Van Damme ». Voire une 4ème possible à la frontière, au niveau de l'étang « Van Hoecke ».

## Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)

De retour de ses quartiers d'hivernage lointains, un premier oiseau est observé le 07-05. Un couple semble être déjà formé le 16-05 et une première parade aérienne intervient entre partenaires le 31-05.

Au vu des indices recueillis, une reproduction probable est estimée sur Hensies. Mais d'autres cantonnements proches ou plus lointains, extérieurs à la réserve, expliquent la forte fréquentation par au maximum 3 individus en même temps.

Le dernier contact de l'année intervient le 25-09.

## Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*)

Qu'ils proviennent de parades aériennes entre partenaires, de phases de chasse ou de nourrissage, les indices concordent avec la reproduction locale de cette espèce commune au sein des marais. Sans qu'elle n'ait pu être valablement quantifiée.

## Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)

Si le premier contact de l'année intervient le 29-03, il faut encore une 15aine de jours supplémentaires pour que le retour de l'espèce se généralise. Les concentrations d'oiseaux en chasse restent faibles avec tout au plus 6 individus le 24-04.

Un couple semble s'être installé (nidification probable) sur Hensies.

Le dernier nous quitte le 23-09.

## Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)

A ne pas confondre avec les « *cris de goret que l'on égorge* », les véritables chants nuptiaux interviennent à partir du mois de février. Présente toute l'année, l'espèce se reproduit au sein de tous les habitats favorables des marais.

## Gallinule poule d'eau (*Gallinula chloropus*)

Hormis peut-être les bandes en recherche mutuelle de nourriture, la Gallinule poule d'eau est une espèce discrète, qu'il n'est pas toujours aisé de quantifier. Raison pour laquelle, les chiffres mentionnés permettent rarement de faire un focus précis sur le taux de fréquentation exact des marais. Ces concentrations d'affamés en quête de denrées salutaires comptent au maximum 20 individus le 02-01 et 30 le 17-01.

Les premières parades sont audibles à partir du 02-04 et un premier nid est occupé le 12-05.

Sur base de ces parades vocales entre partenaires et autres cris d'alarme, mais plus encore des nids couvés, il ressort qu'au moins 22 cantons ont été défendus avec certitude.

Ces derniers se répartissent, comme suit :

- 1 sur l'étang A d'Harchies ;
- 1 sur l'étang B d'Harchies ;
- 1 sur la partie « Pêche » de l'étang principal d'Hensies ;
- 3 sur la partie « Mare à bihoreaux » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 sur la partie « Van Gheyt » de l'étang principal d'Hensies ;
- 2 sur la « Mare à blocs » à Hensies ;
- 1 sur l'étang des petites vasières (« Najas ») à Hensies ;
- 1 sur l'étang des grandes vasières à Hensies ;
- 1 sur l'étang des « Mares à tritons » à Hensies ;
- 2 dans l'amphithéâtre à Hensies ;
- 5 sur l'étang frontalier « Van Damme » et à ses abords (Hensies) ;
- 3 sur l'étang frontalier « Van Hoecke » et à ses abords (Hensies).

De ces 22 cantonnements minimum, seules 3 reproductions ont pu être prouvées :

- 2 nichées de respectivement 1 pullus chacune sur la partie « Mare à bihoreaux » de l'étang principal à Hensies ;
- 1 nichée de 2 pulli sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies.

## Foulque macroule (*Fulica atra*)

Parmi les 450 individus qui se concentrent le 01-01 sur l'étang de Pommeroeul, fuyards climatiques pour la plupart, au moins 142 sont toujours présents le 26-02. Cette période marque également le démarrage des cantonnements dont les rixes territoriales émaillent parfois le calme relatif des marais. Distendus auparavant, selon que les conditions hivernales se durcissent ou non, les liens entre partenaires deviennent alors de plus en plus francs. Ce sont d'ailleurs 270 nicheurs potentiels (hors nids occupés et éclosions) qui sont notés uniquement sur Hensies le 27-04.

Les premiers nids sont occupés à partir du 02-04 et les premiers pulli observés le 17-04.

Ce sont finalement au minimum une 60aine de reproductions certaines qui sont enregistrées sur l'ensemble des marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul, dont la grande majorité sur Hensies. Sur base des 27 nichées pour lesquelles le nombre de rejetons a pu être détaillé, le taux moyen est de 2,6 juv./nichée.

- 10 couples nicheurs sur les parties « Slabbinck » et « Pêche » de l'étang principal d'Hensies pour un total minimum de 32 pulli ;
- 3 couples nicheurs sur le terril d'Hensies (dont 1 et 2 pulli pour 2 d'entre eux) ;
- 15 couples nicheurs sur les parties « Mare à bihoreaux » et « Van Gheyt » de l'étang principal d'Hensies (dont 18 pulli pour 8 d'entre eux);
- 7 couples nicheurs sur l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies pour un total minimum de 19 pulli.

Hâtive à se reproduire, l'errance postnuptiale est rapidement perceptible chez cette espèce suite à l'arrivée massive de visiteurs qui fait grimper l'effectif local (nicheurs compris) à un maximum de 1200 individus le 25-06. Ils semblent apprécier les lieux puisque 1270 exemplaires sont à nouveau comptés le 21-07.

Par la suite et comme souvent pour des espèces communes, la Foulque macroule est peu renseignée et aucune donnée ne permet d'extrapoler de possibles mouvements.

## Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)

L'espèce est peu notée en première période hivernale avec une seule donnée en janvier et un maximum de 91 individus en vol le 13-02. Concentrés sur les prairies des « Sartis » et de l'étang B d'Harchies, plusieurs oiseaux tentent de nouer des liens à partir de la dernière décade de mars. Hormis un maximum de 8 exemplaires

© *Yves Fagniart*

le 11-04, de 2 à 3 couples apparemment formés procèdent régulièrement à des vols de parade, démonstratifs et bruyants, ainsi qu'à des défenses renforcées d'une portion de territoire. Le charivari provoqué par ces évolutions aériennes acrobatiques, rehaussées de cris territoriaux et nuptiaux, n'a apparemment pas permis à l'espèce de se reproduire là. A tout le moins, aucune couvaison n'a pu être avérée. Par la suite, les données restent tout aussi aléatoires et concernent souvent des survols, sans qu'aucun migrateur actif ne soit clairement identifié comme tel. Les maxima étant de 60 ind. le 04-08, 75 le 07-08, 350 le 16-08 et 250 les 09-09 & 10-11.

## Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)

Parallèlement à de très rares observations éparses, la croule est constatée au printemps sur Pommeroeul mais, surtout, sur Hennisse. Ce qui laisse présumer une possible reproduction dans la réserve ou non loin (carreau des « sartis », par exemple).

## Mouette rieuse (*Chroicocephalus ridibundus*)

En première période hivernale, environ 150 individus s'installent en pré-dortoir les 19-02 et 10-03. Au moins 780 oiseaux sont recensés sur les sites de nidification à Hensies (soit minimum 350 couples nicheurs potentiels) le 27-04. Les premiers pulli sont notés à partir du 09-05.

Sans pénétrer sur l'ilot à laridés et sans utiliser une barque sur l'étang d'Hensies, recenser fiablement les nids de Mouette rieuse depuis l'observatoire s'avère très compliqué. Ce sont au total plusieurs centaines de nids qui sont occupés sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve.

- Minimum 1 contenant 2 pulli sur l'étang A d'Harchies ;
- Plusieurs centaines sur l'étang principal à Hensies (îlot compris) ;
- Minimum 5 sur l'étang de Pommeroeul.

## Goéland cendré (*Larus canus*)

Tant en première, qu'en seconde période hivernale, les concentrations les plus importantes sont notées sur l'étang de Pommeroeul (dortoir) avec au maximum 150 individus le 11-01 puis une présence plus faible mais progressive en décembre avec 26 oiseaux le 05, 53 le 17 et 65 le 30.

Deux nids sont tardivement occupés sur la partie « Mare à bihoreaux » de l'étang principal d'Hensies, sans qu'aucune preuve formelle ne soit venue étayer leur réussite ou échec.

## Mouette mélanocéphale (*Ichthyaetus melanocephalus*)

Après un dernier contact intervenu le 21-07-2016, il aura fallu attendre 7 mois pour renouer avec l'espèce. Un premier adulte en plumage nuptial étant vu le 23-02-2017. Les retours s'échelonnent alors progressivement : 6 individus le 05-03, 8 le 14-03, 20 le 15-03, 22 le 18-03, 31 le 21-03, 60 le 25-03 et toujours 58 le 01-04.

L'installation des nicheurs sur l'îlot est, elle aussi, étalée dans le temps : 13 nids occupés le 23-04, 16 le 24-04, 25 le 03-05, 30 le 12-05 et 35 le 01-06 (maximum de cette saison de reproduction). Les premiers poussins sont découverts dès fin-mai, début-juin.

Les derniers représentants de cette phase de nidification sont mentionnés pour la dernière fois le 01-08. En seconde période hivernale, un adulte en plumage internuptial doit errer dans ce coin de Hainaut car il est vu à un mois d'intervalle, les 05-11 et 05-12, sur l'étang de Pommeroeul.

## Sterne Pierregarin (*Sterna hirundo*)

Après un premier retour le 01-04, 3 individus sont déjà présents le 08-04. En remontée prénuptiale, une bande de 30 oiseaux fait halte le 15-04.

Trois nids sont occupés dont au moins deux reproductions sont fructueuses.

- 1 nichée réussie sur l'étang de Pommeroeul ;
- 1 nichée réussie sur la partie « Mare à bihoreaux » de l'étang principal d'Hensies ;
- 1 ancien nid de Foulque macroule (*Fulica atra*) occupé sur la partie « Van Gheyt » de l'étang principal d'Hensies.

Les deux derniers exemplaires de l'année sont observés le 09-09.

## Pigeon colombin (*Columba oenas*)

Si un premier couple semble déjà formé le 26-02, les chants et comportements nuptiaux se généralisent à partir du 21-03.

Hormis de possibles cantonnements isolés sur le chemin des « Sartis » à l'entrée d'Hensies, dans la peupleraie de l'étang « Van Damme » (face à l'observatoire) et au niveau de la lisière frontalière de l'étang « Van Hoecke » à Hensies, deux noyaux concentrent les nicheurs probables grâce aux nombreuses cavités que leur offrent les arbres morts.

- Minimum 6 cantons probables dans la grande peupleraie « Macau » et ses abords immédiats ;
- Minimum 3 cantons probables dans la partie boisée située à l'arrière de la héronnière/cormorantière dans la saulaie « Van Damme ».

## Pigeon ramier (*Columba palumbus*)

Après quelques très faibles concentrations de tout au plus 10-20 individus en première période hivernale, un premier chanteur fait entendre son roucoulement amoureux à partir du 26-02. La reproduction locale de l'espèce est assurée mais non quantifiable. Une bande de 42 migrateurs actifs cingle vers le NE le 27-03. La dispersion postnuptiale est davantage marquée, surtout le 08-10 avec le passage d'au moins 2500 migrateurs actifs en direction du SW (dont un beau groupe d'environ 2000 exemplaires). Les rassemblements sont plus importants en seconde période hivernale avec des maxima croissants d'environ 200 oiseaux le 08-11, 400 le 18-11 et 500 le 18-12.

## Tourterelle Turque (*Streptopelia decaocto*)

Qu'il s'agisse des fermes « Slabbinck » ou « Dubois », ainsi que les CRIE/DEMNA, les bâtiments périphériques à la réserve attirent l'espèce. Après un premier chanteur entendu là à partir du 19-02, plusieurs couples potentiellement nicheurs semblent s'y être installé. Les anciens corons, face à l'entrée d'Hensies, abritent également de probables reproducteurs.

## Tourterelle des bois (*Steptopelia turtur*)

Avec seulement 7 données récoltées et la détection de deux chanteurs ponctuels, l'espèce est au plus mal au sein des marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul. Comme ailleurs, sa population s'étiole toujours plus.

## Coucou gris (*Cuculus canorus*)

Après le retour d'un premier migrateur (♂) le 01-04, les marais accueillent leur habituel contingent de courtisans qui, de loin en loin, émettent leurs tonitruantes strophes bi-syllabiques si caractéristiques. Plus discrètes, les ♀ sont parfois reconnaissables en vol lorsqu'elles arborent une livrée rousse ou, plus souvent, lorsqu'elles émettent leur trille à destination des ♂.

Rien que sur Hensies, le cantonnement est estimé à 7-8 ♂.

Le dernier oiseau nous quitte le 23-07.

## Hibou moyen-duc (*Asio otus*)

Hormis un individu surpris en chasse à plusieurs reprises en mars à l'extrémité de la digue A/B (Harchies) et qui a pu s'installer, comme souvent, sur l'allée de chasse. Au moins deux cantons certains sont défendus vocalement sur Hensies, en deux endroits distants du chemin principal.

## Chouette hulotte (*Strix aluco*)

Les rares données qui relatent ce rapace nocturne laissent entrevoir la possibilité de 3 cantonnements certains sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve.

- 1 dans le « Bois des Châtillons » (face au DEMNA) ;

- 1 dans la grande peupleraie « Macau » à Harchies ;
- 1 au niveau de l'ancienne gare du charbonnage à Hensies.

La seule preuve de reproduction (2 juvéniles criant le 04-07) est obtenue à un endroit où aucun contact n'avait été obtenu auparavant. S'agit-il dès lors d'un 4ème canton ou de l'errance locale d'une nichée née ailleurs ?

## Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)

Un couple semble avoir niché dans ou aux abords de la ferme « Slabbinck ». Ces oiseaux étant probablement ceux qui se laissent régulièrement contempler dans les prairies attenantes, lorsqu'ils prennent un bain de soleil.

## Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*)

L'espèce se porte bien et se montre fréquemment aux quatre coins des marais, tout au long de l'année. Qu'elles se rapportent à des apports de becquées par les adultes ou à des juvéniles clairement identifiés comme tels, les données récoltées permettent d'estimer à au moins deux couples nicheurs certains sur Hensies et au moins un autre probable sur le « Grand Courant ».

## Pic vert (*Picus viridis*)

Au moins 12 cantons probables sont défendus vocalement par les ricanements caractéristiques de ♂ sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve. Aucune preuve de reproduction n'ayant été apportée.

- 7 sur Harchies ;
- 5 sur Hensies.

## Pic épeiche (*Dendrocopos major*)

Au moins 11 cantons probables sont défendus vocalement par des percussions et cris de ♂ sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve. Aucune preuve de reproduction n'ayant été apportée.

- 3 sur Harchies ;
- 8 sur Hensies.

© *Yves Fagniart*

## Pic épeichette (*Dryobates minor*)

Au moins 5 cantons probables sont défendus vocalement par des percussions et cris de ♂ sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve. Aucune preuve absolue de reproduction n'ayant été apportée.

- « Bois des Châtillons » à Harchies;
- Bois à l'extrémité de l'allée de chasse (continuité des prairies « Van den Bussche » à Harchies ;
- Grande peupleraie « Macau » à Harchies ;
- Petite peupleraie « Macau » à Harchies ;
- Bois entre les étangs frontaliers « Van Hoecke » et « Van Damme » à Hensies.

## Alouette des champs (*Alauda arvensis*)

L'espèce ne totalise que 7 données sur l'ensemble de l'année écoulée. Une bande de 37 individus est observée le 12-02. Un chanteur nuptial sans lendemain est uniquement entendu le 02-04 dans les prairies « Sartis ». Le passage postnuptial draine environ 13 migrateurs actifs (max. 5 le 30-10) du 17-10 au 06-11.

## Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)

De retour à partir du 30-03, les concentrations constatées sur les marais, qu'il s'agisse de visiteurs en halte ou de potentiels nicheurs locaux (fermes proches), ne cessent d'augmenter : 10$^{aine}$ d'individus le 01-04, 30$^{aine}$ le 06-04, 60$^{aine}$ le 17-04 et 84 le 01-05. Les migrateurs postnuptiaux s'alimentent sur les marais et/ou y prennent un repos bien mérité. Ils sont au maximum environ 200 le 11-09 et une 100$^{aine}$ le 13-09 à procéder de la sorte. La dernière Hirondelle rustique de l'année est observée le 20-09.

## Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)

Les 3 premières de l'année sont détectées le 11-04. Les maxima enregistrés lors des passages pré et postnuptiaux sont de respectivement +/-85 individus le 27-04 et +/-150 le 31-08. Les derniers oiseaux quittent définitivement les marais le 20-09.

Le pont qui enjambe le canal de Pommeroeul à La Neuville (Hensies) accueille au minimum 63 nids, dont certaines grappes en regroupent 3-4. Au vu de l'historique ci-dessous, cette plus grosse colonie du Hainaut Occidental semble s'être stabilisée après sont pic record de 2008 (minimum 117 nids). Aux portes des

marais, ces oiseaux profitent de leurs milieux riches en insectes pour quérir la ration quotidienne de leurs rejetons.

| 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 64 | 75 | 105 | 92 | 106 | 117 | 65 | 69 | 63 | 63 |

Suivi des nids de la colonie du « Pont d'Hensies »

## Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)

Un oiseau qui survole les marais le 03-09 constitue l'unique donnée de 2017 pour l'espèce qui, dès lors, semble avoir déserté Hensies cette saison.

## Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)

Après d'uniques données mensuelles pour le premier trimestre, notamment un individu de retour au dortoir (roselière A) le 10-03, les premiers nicheurs potentiels commencent à s'installer. Vis-à-vis des possibilités qu'il offre, le bâtit est recherché. Un couple, voire un second, se cantonne au niveau de la ferme « Slabbinck » et une nichée est prouvée au niveau du CRIE/DEMNA par l'apport de becquées le 10-04. Un possible cantonnement est évoqué aux abords de l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies et un premier juvénile émancipé est observé le 13-05 dans les prairies A d'Harchies.

A l'issue de la période de nidification, des oiseaux épars sont notés avec au maximum 9 le 16-09. Du 08 au 30-10, 8 migrateurs actifs (max. 3 le 08-10) survolent les marais et les derniers résidents sont vus les 04 & 08-11.

## Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)

Qu'elle semble révolue l'époque, pas si lointaine, qui offrait à l'espèce des habitats favorables au sein même des marais, où elle ne manquait pas de nidifier. Cette bergeronnette n'est vue qu'à 8 reprises en 2017, entre le 01-04 et le 28-09. Après des isolés en vol les 01 et 07-04, un oiseau est contacté dans les prairies « Sartis » les 28 & 31-05 et 18-06. Sans que ce possible cantonnement n'ait pu déboucher sur une reproduction prouvée. Le passage postnuptial draine quelques visiteurs en septembre : 1 le 03, 3 le 27 et 6 le 28.

## Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)

Espèce nicheuse commune au sein des marais dont le premier chanteur entonne ses strophes de parade à partir du 12-02.

## Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)

Espèce nicheuse commune au sein des marais dont le premier chanteur entonne ses strophes de parade à partir du 19-02.

## Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)

Le premier contact du 10-04 marque également le retour massif de l'espèce au sein des marais. Plus guère remarquée au-delà du mois de juin, un dernier oiseau est néanmoins revu le 23-08.

Minimum 32 cantons sont estimés sur l'ensemble de la réserve.

## Gorgebleue à miroir blanc(*Luscinia svecica*)

Si un premier oiseau se manifeste à partir du 10-03, en sourdine et au crépuscule, les retours se généralisent en dernière décade du mois. Un apport de becquées (A/R) est observé le 18-06 dans la roselière sèche A à Harchies. Un ultime contact intervient le 30-09.

Minimum 41 cantons sont estimés sur l'ensemble de la réserve.

## Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)

Une ♀ est d'abord observée le 05-03 aux abords immédiats de la ferme « Slabbinck » puis un ♂ chanteur s'y cantonne au moins du 02 au 07-04. Ce qui laisse présumer d'une probable reproduction locale. Par la suite, des individus isolés sont observés les 21 et 29-10.

## Grive musicienne (*Turdus philomelos*)

Après l'installation d'un premier chanteur le 19-02, bien d'autres suivent assez vite.

Au moins 15 cantons certains sont défendus vocalement sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve.

- 8 sur Harchies ;
- 4 sur Hensies ;
- 3 sur Pommeroeul.

## Grive draine (*Turdus viscivorus*)

Ce grand turdidé demeure le moins fréquent des marais. En effet, des contacts isolés sont obtenus à seulement une 10$^{aine}$ de reprises sur l'ensemble de l'année. Deux chanteurs distincts sont entendus ponctuellement. Alors qu'il s'est installé à

partir du 26-02 en bordure des prairies « Vanden Bussche », non loin de l'allée de chasse, endroit très fréquenté par essence, il n'a été renseigné qu'à cette unique date. Par contre, le second est détecté le 10-03 en un endroit retiré et peu

fréquenté du terril de Pommeroeul, en surplomb de l'étang « Canaron ». Il peut de fait être raisonnable estimé comme cantonnement possible. Le milieu lui étant favorable, par ailleurs.

## Merle noir (*Turdus merula*)

Espèce nicheuse commune au sein des marais dont le chant nuptial est perçu à partir de la dernière décade de mars mais se généralise le mois suivant.

## Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)

Si les premiers contacts interviennent à partir du 10-04, il faut attendre la dernière décade de ce mois pour que les retours s'intensifient.

Au minimum 32 cantons certains sont dénombrés sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve.

- 7 sur Pommeroeul ;
- 7 sur Harchies ;
- 18 sur Hensies.

L'espèce est observée le 25-07 pour la dernière fois.

## Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)

Un premier ♂, déjà présent le 09-03, est à ce point hâtif qu'il doit patienter une 10aine de jours avant de pouvoir côtoyer ces congénères, dont le gros de la troupe rejoint alors les marais assez vite. La première ♀ apparaît le 30-03. Quelques densités atteignent 16 individus le 27-03 aux abords de la partie A d'Harchies et environ 30 le 01-04 sur le terril d'Harchies. Estimés à une 30aine, les cantons certains doivent néanmoins être supérieurs sur Hensies. L'observation d'un ♂ le 26-10 marque le départ définitif de cette fauvette.

## Fauvette grisette (*Sylvia communis*)

Après l'arrivée des premiers oiseaux le 10-04, les retours s'échelonnent progressivement. Ce sont finalement au minimum 17 cantons certains qui sont défendus vocalement : 2 sur Pommeroeul et les restants sur Harchies (Hensies n'ayant pas fait l'objet de recensements ciblés).

La dernière Fauvette grisette de l'année est observée le 02-07.

© *Yves Fagniart*

## Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)

Très peu observée cette année, les rares données récoltées accréditent néanmoins deux cantonnements probables, proches l'un de l'autre sur Harchies.

Si le premier contact intervient le 16-04, il est assez vite perdu (le 21-06).

## Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Si le premier chanteur de l'année est entendu le 28-03, quelques jours supplémentaires sont nécessaires pour constater un retour plus généralisé. Le dernier contact intervient le 30-08.

Minimum 60 cantons certains sont estimés sur l'ensemble de la réserve (J. Simar).

© *Yves Fagniart*

## Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)

A l'issue d'un premier contact intervenu le 02-04, une semaine supplémentaire est nécessaire pour que les retours soient clairement remarqués. Le dernier oiseau de l'année émet sa stridulation d'orthoptère une ultime fois le 24-07.

Minimum 26 cantons sont estimés sur l'ensemble de la réserve.

## Locustelle luscinioïde (*Locustella luscinioides*)

Une seule donnée se rapporte à cette espèce qui demeure fort fluctuante, selon les saisons. Un chanteur n'est entendu que le 13-05 dans la roselière de Pommeroeul.

## Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)

Nicheur commun dont le taux de reproduction local n'a pu être déterminé.

## Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)

Les retours s'enchaînent directement dès le premier contact intervenu le 13-04 et la dernière est contactée tardivement le 10-10. Au vu de l'étendue des habitats occupés par cette fauvette paludicole, seuls des recensements coordonnés permettent de dresser un bilan de reproduction valable. Ce qui n'est pas le cas cette saison.

## Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*)

Un premier contact intervient le 01-05 mais la population locale ne s'étoffe réellement qu'en fin de première décade du mois. Le dernier oiseau de l'année est noté le 11-07.

Minimum 19 cantons sont estimés sur l'ensemble de la réserve.

## Hypolaïs ictérine (*Hippolais icterina*)

Les 4 données obtenues cette saison relatent toutes des contacts uniques de chanteurs à 4 endroits distincts de la réserve du 12-05 au 14-06.

L'échantillonnage est faible et trop ponctuel pour garantir la reproduction locale de l'espèce en 2017.

## Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)

Bien que relatant la présence d'un chanteur le 27-05 sur le terril d'Harchies, cette unique donnée de la saison est un peu faiblarde pour extrapoler quoi que ce soit.

Il semble peu probable que l'espèce se soit reproduite cette année au sein des marais.

## Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)

Après un premier individu le 21-03, les retours s'échelonnent régulièrement tout au long des semaines suivantes.

Au minimum 45 cantons certains sont dénombrés sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve.

- Minimum 30 sur Hensies ;
- Une 15aine sur Harchies et Pommeroeul.

L'espèce est observée la dernière fois le 25-09.

## Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)

En première période, de 1 à 2 hivernants se maintiennent sur les marais. Si un premier chanteur entonne ses strophes bi-syllabiques dès le 26-02, comptant de la sorte les écus en plein froid, ces manifestations nuptiales ne se généralisent qu'à

partir de la seconde décade de mars. En l'absence d'un recensement ciblé des cantons défendus, il est très difficile de dresser le taux de reproduction local pour une espèce si commune. Les seules preuves de nidification proviennent pour la plupart des alarmes émissent par les parents et de l'unique contact d'un juvénile le 08-07. Au moins un courageux fait le pari de rester en ces lieux en seconde période hivernale et est vu à 3 reprises en novembre et une seule fois en décembre.

## Roitelet huppé (*Regulus regulus*)

A l'exception de 5 le 21-01, de 1 à 3 hivernants errent au sein des marais en première période hivernale, jusqu'au 21-03. Aucun chant nuptial n'étant entendu, il faut attendre un peu plus de 5 mois pour revoir à nouveau ce petit passereau. Ce sont alors de 1 à 3 oiseaux qui fréquentent les lieux jusqu'en fin d'année, avec de faibles maxima de 5 individus les 26-11 et 04-12.

## Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)

Hormis quelques intrépides qui s'enhardissent à vociférer ponctuellement leurs puissantes ritournelles en plein frimas, ce qui étonne toujours de la part d'une si petite boule de plumes, les véritables chants nuptiaux sont décelables à partir de la seconde 15$^{aine}$ de février. Mais ils n'émaillent véritablement l'ambiance générale des marais qu'un mois plus tard. Le Troglodyte mignon est, bien évidemment, un nicheur certain dont le taux d'occupation n'a pu être cerné de manière correcte.

## Mésange charbonnière (*Parus major*)

Le démarrage des chants nuptiaux/territoriaux s'effectue à partir du 26-02. N'ayant fait l'objet d'aucun recensement ciblé, la reproduction de l'espèce demeure certaine mais impossible à quantifier.

## Mésange bleue (*Cyanistes caeruleus*)

Le démarrage des chants nuptiaux/territoriaux s'effectue à partir du 26-02. N'ayant fait l'objet d'aucun recensement ciblé, la reproduction de l'espèce demeure certaine mais impossible à quantifier. La construction d'un nid est mise en évidence le 29-03 et une nichée à l'envol est détectée début juin.

## Mésange nonnette (*Poecile palustris*)

Entre 5 et 6 cantons certains ont été dénombrés sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve.

- 1 sur Harchies ;
- 2 à 3 sur Hensies ;
- 2 sur Pommeroeul.

## Mésange boréale (*Poecile montanus*)

Au moins 11 cantons certains ont été dénombrés sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve. Une seule reproduction a pu être prouvée par l'observation d'un jeune le 13-06 à l'extrémité de la digue A/B.

- 6 sur Harchies ;
- 3 sur Hensies ;
- 2 sur Pommeroeul.

## Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)

Après des rondes hivernales concentrant au maximum une 15$^{aine}$ d'individus les 02-01 et 04-02, un premier nid est en phase de construction le 26-02. Bien qu'une seule preuve formelle atteste de la reproduction locale de l'espèce (4 juvéniles le 18-07 sur la digue A/B), la compilation des données qui relatent des transports de matériaux, de sacs fécaux ou de provendes, ainsi que les cris d'alarme permet d'estimer à au moins 13 le nombre de cantons certains sur l'ensemble du périmètre couvert par la réserve.

- 1 sur Pommeroeul ;
- 4 sur Harchies ;
- 8 sur Hensies.

Le raccourcissement des journées et la dégradation des conditions climatiques favorisent la formation de bandes pour mutualiser les dépenses énergétiques et caloriques. En errances alimentaires aux quatre coins des marais, celles-ci atteignent au maximum 25 individus le 25-10 et 28 le 07-11.

## Sitelle torchepot (*Sitta europaea*)

Après seulement 2 données obtenues en janvier, un oiseau entonne déjà des vocalises démonstratives le 26-02 au début de l'allée de chasse (non loin du CRIE). Par la suite, parmi les quelques chanteurs notés de la dernière décade de mars

jusque fin mai, seul celui cantonné dans la grande peupleraie « Macau » peut être considéré comme probable. D'autres, possibles, ont été isolément découverts sur Harchies, Hensies et Pommeroeul.

## Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)

Espèce présente toute l'année et qui s'installe volontiers au sein même des marais, dès lors que les fentes et cavités qu'elle apprécie lui sont offertes. Un premier chant nuptial est entendu à partir du 19-02 mais il faut attendre la fin du mois pour que ce comportement amoureux soit plus patent.

## Pie bavarde (*Pica pica*)

Présent tout au long de l'année, ce corvidé atteint au maximum 13 individus le 13-02 et 17 le 08-10. Un nid est occupé en périphérie de la réserve, entre la ferme « Dubois » et le DEMNA et un, voire deux, au cœur même des marais.

## Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)

Une bande de 14 individus est observée le 18-03 dans les prairies « Vanden Bussche » à Harchies. Cette espèce nidifie au sein des marais, de manière discrète. Les seules preuves de cette reproduction locale étant régulièrement apportées par des alarmes d'adultes.

## Choucas des tours (*Corvus monedula*)

Comme de coutume, les peupliers vermoulus de la grande peupleraie « Macau » offrent quantité de cavités qui sont mises à profit par l'espèce. Sans que cet effectif nicheur n'ait été précisément recensé. Au moins un couple s'est

également installé dans la cheminée de l'ancienne ferme « Eugénie » qui reste dressée, comme par miracle, alors que le corps de cette ancienne bâtisse se délite toujours davantage.

## Corneille noire (*Corvus corone*)

Quelques faibles maxima sont notés dans les prairies et champs « Sartis » dont environ 70 individus le 28-03 et 140 le 17-10. Espèce nicheuse certaine, quelques nids sont occupés au sein même des marais et au moins un jeune à l'envol est contacté le 04-06 aux abords de la « Mare à blocs » à Hensies.

## Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

Tant en première, qu'en seconde période hivernale, les dortoirs sont bien moins importants que jadis avec au maximum 300 individus qui s'y concentrent le 01-02, 621 le 13-02 et 800 le 26-10.

Un premier chanteur est entendu le 26-02 et des apports de becquées sont régulièrement constatés à partir du 27-04 en des endroits distincts des marais. Une crèche mutuelle d'environ 250 juvéniles, découverte le 27-05, accrédite d'autant plus la reproduction locale de l'espèce. Le passage actif n'a pu être mis en lumière, ni au printemps, ni à l'automne.

## Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)

De retour de leurs quartiers d'hivernage, les premiers chanteurs émettent leurs sifflements structurés à partir du 29-04. Le mois de mai marque néanmoins un retour généralisé de cette espèce flamboyante. Les habitats favorables des marais accueillant une densité habituelle, voire même un peu supérieure cette saison.

Sans cesse en mouvement et souvent agglutinés, il n'est pas aisé de dresser le taux de fréquentation puis de cantonnement de ces chanteurs qui évoluent toujours assez haut dans les frondaisons. Les données éparses témoignant à souhait de cette difficulté.

Une 20$^{aine}$ de cantons certains peut raisonnablement être estimée sur l'ensemble de périmètre couvert par la réserve.

- Minimum 7 sur Harchies ;
- Minimum 11 sur Hensies ;
- 1 à 2 sur Pommeroeul.

Parmi les migrateurs les plus tardifs à réintégrer leurs zones de reproduction continentales, Le loriot ne s'y attarde guère car le dernier chanteur est entendu le 14-08. Trois mois et demi pour revenir, s'installer, attirer sa belle, réussir sa couvée, la nourrir, l'émanciper et repartir en des contrées lointaines !

## Moineau domestique (*Passer domesticus*)

Cette espèce se reproduit logiquement au niveau des bâtiments périphériques à la réserve (fermes essentiellement).

## Moineau friquet (*Passer montanus*)

Si quelques reproductions restent possibles au niveau des fermes « Slabbinck » et « Dubois », où 9 individus sont comptés au maximum le 21-03, une nidification certaine a été menée dans une anfractuosité du pignon du CRIE.

## Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

Espèce nicheuse au sein des marais et dont un premier chanteur est entendu le 19-02. Il faut cependant attendre la seconde décade de mars pour que les vocalises nuptiales se généralisent. Par la suite, le passage postnuptial est faiblement mis en lumière par l'observation de 37 (25+12) migrateurs actifs en vol vers le SW le 08-10 puis encore 15 (10+4+1) le 17-10.

## Verdier d'Europe (*Chloris chloris*)

Un moins un canton certain est repéré en février aux abords du bâtiment du DEMNA. Par la suite, la seule donnée saillante relate le passage en vol de 8 individus le 30-11, sans qu'il ne soit possible de savoir s'il s'agit de migrateurs actifs ou de résidents.

## Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)

Présent toute l'année, essentiellement au niveau du terril d'Harchies, ce passereau ventru atteint au maximum 6 individus le 09-02. Au moins un canton certain est noté sur Hensies.

## Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)

Présent toute l'année, ce passereau entame son chant nuptial, discret et peu puissant, à partir du 26-02. Une 20aine d'individus se concentre sur la digue A/B début mars pour mutualiser leur recherche de nourriture. Ce qu'accrédite le retour au dortoir (roselière A d'Harchies) d'environ 30 oiseaux le 10-03 en soirée.

Une 30aine de cantons est estimée pour l'ensemble de la réserve.

© *Yves Fagniart*

## Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)

Peu de données sont obtenues pour cette espèce en 2017. En première période hivernale, 2 individus sont notés le 05-01 dans les prairies « Sartis » puis le 24-02 dans celles de l'étang frontalier « Van Damme » à Hensies. Un ♂ chanteur qui se cantonne au sein des prairies et champs « Sartis » à partir de la seconde décade de mai est peut-être finalement parvenu à attirer une compagne.

© *Yves Fagniart*

# Hivernage, migration & résidents non nicheurs

Cette rubrique reprend l'ensemble des espèces qui ont transité par les marais, voire y ont résidé, sans s'y installer pour tenter une reproduction. Elle regroupe dès lors les migrateurs actifs qui survolent simplement le site ou s'y arrêtent pour des durées variables, des hivernants, des résidents non nicheurs,...

## Cygne de Bewick (*Cygnus bewickii*)

Déjà présents depuis le 20-12-2016, 12 individus (9 adultes & 3 immatures) se remisent essentiellement sur les étangs A et B d'Harchies jusqu'au 02-03. Ils sont moitié moins le lendemain et l'observation de 5 oiseaux le 04-03 marque la fin de cet hivernage. Plus de 7 mois plus tard, un premier adulte s'installe à partir du 28-10 au sein des marais. Esseulé quelques jours, il est ensuite régulièrement rejoint par d'autres adultes : 3 du 01 au 12-11, 5 du 13-11 au 12-12, 6 du 16-12 au 26-12, 8 le 27-12, 9 le 28-12, 13 le 30-12 et 10 le 31-12.

## Oie rieuse (*Anser albifrons*)

Arrivées en 2016, ces oies fluctuent entre 14 et maximum 23 individus jusque début février. Au gré de réelles arrivées et départs ou, plutôt, de leur détection sur le terrain ? Au moins 6 oiseaux restent à demeure par la suite et stationnent un mois durant jusqu'au 05-03. Un seul est encore irrégulièrement noté du 14-03 au 22-04 puis à deux reprises les 01-05 et 11-05. Pour le peu qu'il s'agisse toujours du même. Les 13 migrateurs actifs qui survolent les marais le 17-12 en direction du SW constituent l'unique contact de l'espèce en seconde période hivernale.




## Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)

Cet anatidé au plumage contrasté fréquente l'ensemble des marais tout au long de l'année. En première période hivernale, le maximum est de 35 individus le 27-01. Par la suite, cet effectif décroît régulièrement et ne restent alors que quelques couples qui semblent formés mais ne s'installent toujours pas. Les transferts vers

ou en provenance de la France sont légion durant la période favorable à sa reproduction. Quelques arrivées renforcent ponctuellement ce noyau car des maxima de 12 individus sont comptés les 17-04 & 16-05 et 15 le 13-05. A partir du 23-07, une forte concentration de juvéniles est constatée mais reste difficile à interpréter : 23 le 23-07, 36 le lendemain et toujours 11 le 07-08. Après avoir totalement déserté le site pour former des rassemblements de mue en des endroits côtiers éloignés, les trois premiers sont de retour le 08-10. Il faut que les conditions climatiques se durcissent pour voir enfin la population locale augmenter avec des maxima de 13 hivernants le 05-12, 14 le 17-12 et 22 le 18-12.

## Canard pilet (*Anas acuta*)

Hormis 1 ♀ le 12-02, de 1 à 3 ♂ sont notés jusqu'au 14-02, plus régulièrement en janvier. A la suite d'un pic de 9 ♂ intervenu le 16-02, de 1 à 2 ♂ sont toujours présents du 19-02 au 04-03. Le passage prénuptial drainant alors au maximum 17 individus qui reprennent temporairement des forces les 10 et 11-03 avant de continuer leur route par vagues successives. Ce qui rabaisse cette concentration à 8 ind. le 14-03, 6 le 18-03, 4 le 25-03 et 2 le 28-03. Les 1 à 2 ♂ vus irrégulièrement en avril sont peut-être ceux qui étaient là de longues dates à l'arrivée de ces visiteurs actifs. Après un peu moins de 5 mois d'absence, un ♂ est revu le 26-09, 11 migrateurs actifs en vol vers le SW le 19-10 et 6 individus le 28-10. Minimum 1 à 2 exemplaires hivernent au sein des marais en novembre et décembre.

## Canard siffleur (*Mareca penelope*)

Alors que la plupart des contacts relatent de 1 à 4 oiseaux jusqu'au 09-04, quelques maxima ponctuels bousculent cette apparente stabilité : 6 ind. le 24-02, 9 le 10-03 et 10 le 19-03. Après 3 mois d'absence, de 1 à 3 individus sont très irrégulièrement détectés du 10-07 au 19-10. Cet étalement sur une si longue période, au cœur même de la dispersion postnuptiale de l'espèce, laisse augurer qu'il se soit souvent agit d'oiseaux différents stationnant sur le site fortuitement. Ce que montrent plus clairement les 23 exemplaires observés le 28-10, ainsi que les 15 le 02-11. Par la suite, hormis 9 le 30-11, de 1 à 4 hivernants sont présents au moins jusqu'à la fin de l'année.

## Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)

Un ♂ en plumage nuptial est observé sur Hensies le 26-06 et un ♂ en plumage d'éclipse l'est à nouveau le 27-08.

## Nette rousse (*Netta rufina*)

Observé à 3 reprises entre le 05-03 et le 21-03, 1 ♂ est rejoint par 1 ♀ le 12-03. Ensuite, hormis 4 individus le 19-08, 2 ♀ stationnent au sein des marais du 13 au 21-08. Pour finir, 3 ♂ et 2 ♀ s'alimentent sur les étangs A et B d'Harchies le 06-11.

## Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)

Disséminés aux quatre coins du site, en mouvements continuels dans mais aussi aux abords des marais et plongeur de surcroît, il n'est guère évident d'appréhender le taux d'hivernage de l'espèce.

Les observations aux dortoirs et, surtout, les comptages mensuels coordonnés des oiseaux d'eau (RHOE) y parviennent le mieux. En première période, les maxima atteignent de cette manière 13 individus (9 ♂ & 4 ♀) le 21-02 et 18 (11 ♂ & 7 ♀) le 23-02. Les deux derniers hivernants étant vus le 29-03. Après plus de 6 mois d'absence, un premier ♂ rejoint les marais à partir du 18-10. L'effectif stagne ensuite à maximum 3 oiseaux jusqu'au 13-11. Quelques recensements plus minutieux permettent alors d'envisager une population légèrement plus importante, sans être exceptionnelle : 6 individus (4 ♂ & 2 ♀) le 17-11 et 9 (5 ♂ & 4 ♀) le 17-12.

## Harle piette (*Mergellus albellus*)

Une ♀ est observée le 06-01, 2 ♀ à 5 reprises du 12-01 au 05-02, 1 ♂ et 3 ♀ du 06 au 18-02 et 1 ♂ et 2 ♀ du 19-02 au 05-03. L'une des ♀ semble avoir la bougeotte car elle est plus irrégulièrement notée parmi ses comparses qui stationnent sur l'étang de Pommeroeul.

## Harle bièvre (*Mergus merganser*)

A nouveau, cette espèce a la bougeotte, ce qui complique la connaissance exacte de l'état de l'effectif des hivernants qui fréquentent les marais. Les maxima en première période sont de 14 individus (5 ♂, 4 ♀ & 5 indéterminés) le 06-01 puis 12

(7 ♂ & 5 ♀) les 05 & 06-02. Le dernier (♂) quitte les lieux au-delà du 25-03. Après un peu plus de 7 mois, les deux premiers arrivants sont notés le 03-11. Ils sont alors peu nombreux à s'installer sur les étangs du site. La compilation de données disparates confirme cependant la présence d'au moins 8 ♂ et 9 ♀ durant les deux dernières décades de décembre.

## Héron pourpré (*Ardea purpurea*)

Un seul individu est observé en vol le 10-05.

## Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)

Au vu des données encodées, aucun oiseau ne semble s'être arrêté car toutes relatent des survols. Si la plupart des contacts concerne quelques individus, les maxima atteignent quand même 14 exemplaires le 16-02 et 20 le 24-04. Les 4 dernières de l'année sont vues le 01-08. Ces Cigognes blanches ayant été observées à des dates éloignées, il est raisonnable d'estimer à au moins 53 oiseaux qui ont transités au-dessus de la réserve, lors de leurs mouvements pré et postnuptiaux.

## Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)

Ce rapace piscivore est très peu observé cette année. La migration de retour au printemps draine seulement deux visiteurs qui sont observés isolément les 19-04 et 15-05. Après un adulte contacté le 31-08, un juvénile stationne au moins les 03 et 04-09, ainsi que peut-être toujours cet adulte. Un exemplaire fréquente les lieux le 15-09 et un migrateur actif en vol vers le S le 21-09 constitue la dernière mention de l'année.

## Busard St-Martin (*Circus cyaneus*)

Une ♀/imm. est observée à 3 reprises en janvier, alors qu'elle chasse de manière furtive et discrète au ras des prairies et roselières. Un ♂ est contacté 4 fois en février puis encore le 29-03. Un individu très hâtif revu le 09-08, l'avait peut-être déjà été le 03-07. L'hivernage de l'espèce doit être très faible, voire inexistant, en seconde période car une ♀/imm. n'est détectée que le 28-12.

## Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)

Toujours aussi peu fréquent au sein des marais, ce puissant rapace y est contacté à 5 reprises : 1 individu le 30-03, 1 ♀ le 15-09, 1 ♂ le 04-10, 1 en chasse le 18-11 et un dernier ♂ le 28-11.

## Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)

Très régulièrement observé au sein même des marais lorsqu'il y chasse, ce petit rapace au vol stationnaire si caractéristique atteint au maximum 3 individus le 02-09.

Sa reproduction proche fait peu de doute, malgré l'absence de preuve formelle.

## Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)

Sauf en mars, ce rapace robuste est observé chaque mois lorsqu'il survole les marais ou, plus souvent encore, y chasse. Ils sont deux à se côtoyer ou se houspiller les 19-10 et 22-11.

## Faucon émerillon (*Falco columbarius*)

Des individus isolés sont observés sans lendemain les 13-11 et 06-12.

## Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)

Si le passage prénuptial draine un individu le 09-04, ils sont plus nombreux à transiter par les marais à l'issue de la période de reproduction. De 2 à 4 oiseaux différents s'alimentent alors sur des vasières distinctes du 31-08 au 02-09 puis les 09-09 et 20-10. Les niveaux anormalement bas des étangs, bien avant la migration automnale, ayant probablement offert des conditions plus favorables que celles qui prévalent habituellement.

## Huîtrier pie (*Haematopus ostralegus*)

Bien que les contacts soient espacés, il est vraisemblable qu'un individu ait stationné ponctuellement sur les marais du 10 au 27-05. Par la suite, un oiseau esseulé est à nouveau présent le 08-07.

## Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)

Le 10-03, 14 migrateurs descendent en soirée d'une altitude élevée et se posent directement sur l'étang A d'Harchies, parmi les laridés. Deux oiseaux survolent les marais les 27-03 et 01-04. Quatre mois plus tard exactement, un individu est observé le 01-08 puis, à nouveau, du 22 au 26-08. Un dernier est contacté tardivement le 30-12.

## Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)

Un migrateur est observé sur les vasières de l'étang A d'Harchies le 13-06. Lors du passage postnuptial, un individu profite du 05 au 16-08 du garde-manger que lui offrent les plages boueuses bien dégagées autour des étangs A et B d'Harchies. A nouveau, un oiseau ne manque pas cette aubaine le mois suivant, très régulièrement du 03 au 16-09 puis encore les 21 et 25-09. Pour le peu qu'il s'agisse toujours du même.

## Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)

Deux individus font une halte alimentaire les 22 et 23-09 sur les vasières largement découvertes de l'étang B d'Harchies.

## Bécasseau variable (*Calidris alpina*)

Les vasières qui ceinturent les étangs A et B d'Harchies permettent aux affamés de s'y repaître. Après un individu observé à 3 reprises en septembre, 3 le sont le 01-10 et 4 le 03-10. Par la suite, de 1 à 2 oiseaux s'attardent encore jusqu'au 11-10 puis un ultime exemplaire 5 jours de plus.

## Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)

Un premier migrateur fait halte sur les marais le 25-07 puis 2 du 04 au 07-08 et 1 seul le 09-08. L'ultime oiseau de l'année est noté le 15-09.

## Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)

Minimum 1 à 2 individus se partagent la réserve tout au long de l'année écoulée. Il n'est cependant pas évident d'appréhender l'effectif réel qui a résidé ou transité par les marais et seuls quelques maxima mettent en lumière ces mouvements ou errances : 3 exemplaires les 07-04, 30-08 et 01-11, ainsi que 6 les 07-08 et 31-08.

## Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)

Un premier individu esseulé fréquente les marais pendant une semaine à partir du 24-04. Par la suite, du mois de mai à la première décade d'août, de 1 à 2 oiseaux sont régulièrement notés. Les hausses temporaires de l'effectif local, jusqu'à des maxima de 3 exemplaires le 07-08 et 5 les 10-05 & 31-07, correspondent peut-être simplement à la concentration à un endroit donné de l'ensemble des résidents qui, en d'autres temps, errent dans les marais à la recherche de leur provende. A moins que ce ne soient de réels visiteurs en brèves haltes. Le dernier contact de l'année intervient le 19-11.

## Chevalier gambette (*Tringa totanus*)

Après un premier contact obtenu le 10-03, de 1 à 4 individus sont régulièrement observés jusqu'au 15-05 avec des maxima ponctuels de +/-60 exemplaires le 15-04 et 19 le 07-05. L'arrivage d'un unique visiteur le 04-10 met un terme à l'absence remarquée de l'espèce depuis plus de 4 mois. Deux autres sont encore notés le 24-10 et un dernier le 28-10.

## Chevalier arlequin (*Tringa eythropus*)

Trois migrateurs distincts font une brève halte sur les marais les 19-10, 01 et 19-11.

## Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)

Les deux premiers visiteurs de l'année sont vus le 14-04. Un premier pic atteint 14 individus le lendemain. Ensuite, hormis 2 ind. le 09-05, un oiseau esseulé fréquente le site où le survole à 7 reprises durant un mois du 17-04 au 17-05. Le passage postnuptial est mis en lumière dès le 01-07 avec le retour d'un premier oiseau qui semble stationner jusqu'au 05-08. Un maximum de 9 exemplaires est noté le 23-07. A l'exception de 2 ind. le 06-08 et 3 le 07-08, un seul est observé jusqu'au 18-08 puis, à nouveau, du 04-09 au 13-09 et les 30-09 et 06-10. Deux visiteurs se côtoient les 07 & 17-10 et un ultime voyageur s'arrête le 19-10.

## Barge à queue noire (*Limosa limosa*)

Avec seulement deux maigres données de 2 migrateurs actifs en vol vers le NE le 10-03 et un en brève halte le 18-03, cette année 2017 ne peut être marquée d'une pierre blanche pour l'espèce et mérite d'être oubliée au plus vite.

## Courlis cendré (*Numenius arquata*)

Après l'audition d'au moins un exemplaire le 02-01, un hivernant semble prendre temporairement ses quartiers au sein des marais du 22 au 26-02. Un peu plus de 6 mois plus tard, un individu fait une halte alimentaire des 02 au 04-09 et un migrateur actif qui cingle vers le SW survole la réserve le 26-10.

## Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*)

Seules sont observées des bandes de migrateurs actifs lorsqu'elles survolent les marais. Deux lors du passage prénuptial (12 ind. le 01-04 et 3 le 22-04) et une en errance postnuptiale (46 ind. le 23-07).

## Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)

Après une absence totale de contact remarquée en janvier, de 2 à 5 individus sont observés jusqu'au 24-04, de moins en moins régulièrement. Deux pics de 6 oiseaux intervenant les 01-04 et 10-04. Cinq exemplaires sont encore vus une dernière fois le 03-05. Les niveaux étant encore descendus entretemps, les vasières qui ceinturent les étangs attirent à nouveau l'espèce à partir du 31-07. Pour les 5 derniers mois de l'année, ce sont de 1 à 3-4 individus, plus rarement 5, qui profitent de ces garde-mangers. Apparente stabilité dont ne se démarquent que quelques faibles maxima de 8 ind. le 05-09, 10 le 15-09 et 6 le 07-11.

## Combattant varié (*Calidris pugnax*)

Les marais offrent le couvert à deux migrateurs prénuptiaux le 28-03 puis un seul le 15-04. Cinq mois plus tard exactement, un individu est noté le 15-09 puis est rejoint par un second à partir du 26-09. Présents jusqu'au 26-10, ces deux compères profitent des milieux fangeux découverts par des niveaux d'eau anormalement bas.

## Goéland argenté (*Larus argentatus*)

En décembre, les concentrations observées sur l'étang de Pommeroeul (dortoir) atteignent des maxima de 53 individus le 05, 55 le 23 et 80 le 30. Ne perdons pas de vue cependant que les grands goélands sont très mobiles entre les différents dortoirs, ce qui engendre les variations dans leur taux de fréquentation.

## Goéland leucophée (*Larus michahellis*)

Ce laridé a été observé une 30aine de fois sur l'ensemble de l'année avec au maximum environ 50 individus concentrés le 11-10 sur l'étang de Pommeroeul (dortoir).

## Goéland pontique (*Larus cachinnans*)

Même en se rattachant aux détails des plumages, lorsqu'ils sont notés, connaître l'effectif réel hébergé par les marais reste une gageure. De 1 à 3 individus (maximum 6 le 28-02) fréquentent la réserve à 7 reprises du 05-02 au 25-03. Ensuite, hormis un pic de 6 oiseaux le 28-10, de 1 à 4-5 visiteurs sont notés 9 fois durant les deux derniers mois de l'année.

## Goéland brun (*Larus fuscus*)

Exception faite d'un pic ponctuel d'environ 400 individus le 12-11, les concentrations observées sur l'étang de Pommeroeul (dortoir) sont assez stables dans le temps : environ 80 oiseaux les 25-03 & 04-11 et 88 le 05-12.

## Mouette pygmée (*Hydrocoloeus minutus*)

Hormis un individu observé le 03-09, toutes les autres données découlent du passage prénuptial. Les deux premières de l'année sont découvertes le 11-03. Moins d'une semaine plus tard, 6 oiseaux sont vus le 17-03 puis 3 du 18 au 20-03, 5 le 21-03 et encore 2 du 22 au 25-03. Une seconde vague d'arrivages intervient du 09 au 15-04 avec au maximum 8 ind. le 10-04, ainsi qu'une 3ème du 22 au 29-04 avec un pic de 11 ind. le 23-04 (record de l'année). Les oiseaux esseulés présents le 05-05 puis du 12 au 13-05 marquent la fin de ces afflux printaniers. Au vu des données détaillées ci-dessus, au moins une 30aine de Mouettes pygmées différentes ont transité par les marais ou y ont séjourné pour une durée maximale de 9 jours.

## Guifette noire (*Chlidonias niger*)

Au vu de ce qui va être détaillé, une estimation vraisemblable permet de fixer à une 20aine le nombre de visiteurs qui ont transités brièvement par les marais ou s'y sont installés de manière plus durable. Adultes en plumage nuptial, les 3 premières Guifettes noires de l'année sont vues le 15-04 sur l'étang B d'Harchies. Quatre autres adultes parés des mêmes couleurs réalisent une courte halte alimentaire le 25-04 puis encore 2

le 05-05. Ces dernières intègrent peut-être le groupe de 6 individus qui prolongent leur séjour du 07 au 09-05. Tout comme l'unique oiseau découvert le lendemain qui pourrait être l'ultime membre de cette bande. Trois sont à nouveau présents les 19 et 20-05 et un dernier le 21-06. La dispersion postnuptiale rabat 1 juvénile le 18-08 puis un second du 03 au 06-09.

## Martinet noir (*Apus apus*)

Les deux premiers oiseaux de l'année qui survolent les marais ou s'y alimentent sont notés le 15-04. Un faible pic d'une 60$^{aine}$ d'oiseaux est atteint le 03-05. La migration postnuptiale est décelable à partir du 08-07 avec au maximum le passage d'une 20$^{aine}$ de visiteurs le 07-08. Le dernier de l'année étant observé le 15-09.

## Pic noir (*Dryocopus martius*)

A nouveau, un chanteur se cantonne sur Hensies mais ne parvient pas à s'apparier avec une partenaire.

## Pic mar (*Dendrocoptes medius*)

Un individu est entendu le 28-08 et un second est vu le 08-11.

## Alouette lulu (*Lullula arborea*)

Des migrateurs actifs survolent les marais à 3 reprises : 6 individus le 10-10 et un seul les 17-10 & 05-11.

## Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)

De retour de leurs quartiers d'hivernage le 01-04, les premières Hirondelles de rivage de l'année atteignent directement une concentration importante de 55 individus. Par la suite, les haltes alimentaires sont légion avec des groupes de maximum 150 oiseaux le 10-04 et 120 le 22-04. Deux migrateurs actifs survolent les marais le 09-05 en direction du NW. Environ 400 exemplaires s'installent le 04-07 dans la roselière de l'étang A d'Harchies pour y passer la nuit. Après 6 voyageurs postnuptiaux en direction du SW le 06-09 et un pic de passage de +/-50 ind. le 09-09, le dernier visiteur de l'année est contacté le 15-09.

## Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)

Quelques hivernants sont contactés en première période avec au maximum 7 individus le 01-02. Le dernier étant vu le 02-04. En seconde période hivernale, les maxima sont enregistrés lors des retours crépusculaires aux dortoirs avec 10 individus le 08-10 et 11 le 03-11.

## Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)

Hormis 1 individu le 13-02, 2 de retour au dortoir le 10-03 et 5 sur le terril de Pommeroeul le 26-07, il faut attendre la dispersion postnuptiale pour que l'espèce soit davantage contactée au sein des marais. Si la plupart des données relatent des migrateurs en vol actifs, 8 exemplaires en quête de nourriture sont observés le 19-11.

## Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)

Après un premier contact intervenu le 14-07, l'espèce est observée une 20$^{aine}$ de fois jusqu'à la fin de l'année. Sans qu'il ne soit bien évidemment possible de connaître le nombre exact d'individus différents ayant transités par les marais. Hormis 3 oiseaux le 30-09, de 1 à 2 sont régulièrement vus du 27-08 au 30-09. Un seul l'est encore par après jusqu'au 18-12, mais moins souvent.

## Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)

Un migrateur fait une brève halte le 16-04 le long du chemin des Maillettes à Harchies.

## Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)

Deux migrateurs printaniers distincts font de brèves haltes les 17-04 et 06-05 et un seul fait de même le 03-09 lors de sa dispersion postnuptiale.

## Tarier pâtre (*Saxicola rubicola*)

Des migrateurs isolés font de courts arrêts dans les milieux ouverts des marais les 20-09 et 19-11.

## Grive mauvis (*Turdus iliacus*)

Pas très fréquent sur l'ensemble de l'année, ce turdidé est peu présent en première période hivernale avec de faibles maxima de +/-10 individus le 12-02 et 22 de retour au dortoir le 10-03, alors que, dans le même temps, cet affût vespéral permet la détection de 87 voyageurs actifs en vol vers le N. Le dernier oiseau s'attarde jusqu'au 03-04, guère au-delà. Un peu plus de 6 mois plus tard, un premier contact intervient le 16-10 et, hormis des afflux de +/-30 ind. le 19-10 puis +/-61 le 26-10, les hivernants fluctuent de manière importante entre 10 et 20 exemplaires.

## Grive litorne (*Turdus pilaris*)

Quelques maxima ressortent en première période hivernale : +/-150 individus le 05-01, +/-100 le 19-02, +/-120 le 05-03 et +/-50 le 17-03. Le dernier oiseau déserte les lieux le 01-04, alors que le printemps vient de démarrer. Deux saisons plus tard, le premier visiteur est de retour à partir du 30-10 mais il faut attendre le mois de décembre pour que l'effectif local décolle enfin avec de faibles pics de 45 exemplaires le 05 et +/-50 le 18-12.

## Roitelet triple-bandeau (*Regulus ignicapilla*)

Des oiseaux esseulés sont contactés à seulement 3 reprises en première période hivernale. Un ♂ chanteur est entendu uniquement le 01-04 sur le terril d'Harchies. A l'issue de la période de reproduction, un individu s'installe brièvement sur Harchies du 03 au 09-09. Par la suite, hormis un maximum de 5 exemplaires noté le 29-10, de 1 à 3 visiteurs sont très irrégulièrement détectés jusqu'au 22-11, guère au-delà.

## Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)

Des migrateurs en halte sont observés isolément les 07-08 et 09-09.

## Mésange noire (*Periparus ater*)

Une première est observée le 27-08, avant que des mouvements invasionnels ne soient clairement mis en lumière par d'autres arrivées : 5 en vol et 8 en halte le 03-09, 1 le 07-09, 2 le 08-10, 1 les 17 & 22-10 et 3 le 01-11.

## Mésange huppée (*Lophophanes cristatus*)

Au moins un individu fréquente brièvement les marais du 18 au 21-06.

## Panure à moustaches (*Panurus biarmicus*)

Le premier contact de 2017 intervient exactement 10 mois après le dernier de 2016 (2 ♀ le 27-12-2016). Qu'elle soit disséminée au sein de la vaste roselière de l'étang A d'Harchies ou concentrée dans son errance alimentaire, cette bande d'environ 25 individus découverte le 28-10 constitue, sans l'ombre d'un doute, le record de présence pour l'ensemble de l'année 2017. Plus souvent entendues que vues, d'autant plus lorsqu'elles déambulent dans les phragmitaies, à l'abri des inflorescences, il n'est jamais évident de connaître l'effectif présent à un moment précis. Bien que fluctuante, la population semble se stabiliser à au moins 4 individus jusqu'au 28-11. Deux pics ressortent néanmoins avec 7 oiseaux le 03-11 et 12 le 14-11. Après un mois d'absence ou de non-détection, un dernier visiteur est renseigné les 26 et 28-12.

## Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)

Entre éloignement des corbeautières et rareté de milieux de gagnage adéquats dans le périmètre intérieur des marais, cette espèce n'a été notée qu'une 20aine de fois lors de survols. Les maxima étant de 14 (10+4) le 04-06 et 15 le 26-07.

## Pinson du nord (*Fringilla montifringilla*)

La détection de 2 individus le 13-10 marque l'arrivée de l'espèce au sein des marais. Elle y sera régulièrement observée par la suite jusqu'au 25-11. Hormis 7 individus en vol le 19-10, ce sont de 1 à 2 oiseaux qui sont le plus souvent notés. Quatre probables fuyards actifs survolent le site en direction du S-SW : 3 (1+1+1) le 17-10 et 1 le 31-10.

## Linotte mélodieuse (*Linaria cannabina*)

La fréquentation de l'espèce est à ce point si faible, qu'elle peut être énumérée sans craindre de surcharger le texte : 1 individu les 09-04, 21-05, 14-06 et 11-11, 2 le 18-10 et 5 les 27-01 & 07-05.

## Sizerin flammé (*Acanthis flammea*)

Un exemplaire est observé le 18-11, 6 le 17-12 et 30 le 28-12.

## Sizerin cabaret (*Acanthis cabaret*)

Après 7 individus présents le 26-10, 2 le sont les 02 et 05-11 puis un seul les 06 & 17-11 et 06 & 17-12.

## Sizerin boréal (*Acanthis flammea flammea*)

Six individus sont contactés le 17-12 à Hensies.

## Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)

Une bande d'une 30aine d'oiseaux fréquente les marais et ses abords les 02 et 12-01. Par la suite, les données sont disparates et concernent peu d'individus. Après un dernier contact le 30-04, l'espèce n'est détectée qu'à 3 reprises durant la période de nidification. A l'entame de l'automne et jusqu'à la fin de l'année, hormis une fréquentation plus importante en novembre qui culmine à 15 exemplaires le 22, la population locale s'établit à 2-3 hivernants tout au plus.

## Tarin des aulnes (*Spinus spinus*)

Présente depuis plusieurs mois déjà, l'espèce atteint au maximum une 30aine d'individus le 09-02 et, durant cette première période hivernale, n'est plus vue au-delà du 26-02. Un peu plus de 7 mois plus tard, le retour de cet hivernant s'opère à partir du 07-10. Avec seulement 33 exemplaires le 11-11, les bandes sont à nouveau peu nombreuses en seconde période hivernale.

## Serin cini (*Serinus serinus*)

Fait devenu exceptionnel au fil des ans, un chanteur fait brièvement entendre ses trilles amoureux le 12-03 à la limite des prairies B et de la roselière des « 15 Parts » à Harchies.

## Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)

Après un unique contact obtenu le 29-03, l'automne en apporte un peu plus. Hormis 3 individus le 10-10, des isolés sont irrégulièrement observés à 7 reprises du 22-09 au 28-12.

## Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)

De rares oiseaux esseulés sont repérés par leurs cris les 27-08 et 02-12, lorsqu'ils survolent les marais.

© *Yves Fagniart*

# Raretés

Cette rubrique reprend les espèces les plus rares en 2017. Si certaines sont annuelles ou le deviennent petit à petit, d'autres se montrent beaucoup plus rarement dans le périmètre des marais.

## Bernache à cou roux (*Branta ruficollis*)

Un individu à l'origine incertaine est observé le 18-03 dans les prairies B d'Harchies.

## Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*)

L'espoir de voir l'espèce tenter à nouveau une installation dans la héronnière ne s'est malheureusement pas concrétisé. En effet, après la brève halte d'un adulte en plumage nuptial le 17-05, un individu en plumage inter-nuptial est à nouveau présent sur l'ensemble des marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul du 10 au 18-06.

## bis falcinelle (*Plegadis falcinellus*)

Un individu séjourne sur les marais du 25-08 au 15-09.

## Cigogne noire (*Ciconia nigra*)

Deux juvéniles en migration active vers le S survolent les marais le 01-08 puis un adulte fait de même le 16-10.

## Milan royal (*Milvus milvus*)

De 1 à 3 individus différents sont contactés isolément les 29-03 et 15 & 18-04.

## Echasse blanche (*Himantopus himantopus*)

Une ♀ opte pour une brève halte dans les prairies B d'Harchies le 26-04 puis de 1 à 2 individus s'arrêtent à nouveau au passage postnuptial mais sur de plus longues périodes. En effet, un oiseau est d'abord présent du 20 au 23-07 puis, le même ou pas, du 31-08 au 18-09.

## Bécasseau minute (*Calidris minuta*)

Un juvénile en halte se repaît les 11 et 12-09 sur les vasières fort découvertes en bordure de l'étang A d'Harchies.

## Bécassine sourde (*Lymnocryptes minimus*)

L'envol d'un oiseau le 03-05 à Hensies constitue la seule donnée de l'espèce en 2017.

## Sterne naine (*Sternula albifrons*)

Deux migrateurs réalisent une brève halte alimentaire le 10-05 sur l'étang B d'Harchies.

## Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*)

Un juvénile prolonge son séjour sur l'étang A d'Harchies du 20 au 26-09.

## Hibou Grand-duc (*Bubo bubo*)

Le 07-10, un individu posé en surplomb de l'îlot aux laridés décolle puis est revu au-dessus des « Mares aux tritons ».

## Hibou des marais (*Asio flammeus*)

Un individu en halte est découvert le 02-04 puis un second en migration active le 08-10.

## Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)

Un migrateur en halte est observé le 02-09.

## Pipit rousseline (*Anthus campestris*)

Trois migrateurs en halte sont observés le 16-08 en bordure de prairies B d'Harchies (roselière B).

## Merle à plastron (*Turdus torquatus*)

Un individu en brève halte est observé uniquement le 17-04.

## Pouillot à grands sourcils (*Phylloscopus inomatus*)

Un migrateur en très brève halte est entendu uniquement le 26-10 sur Harchies par de rares chanceux.

## Remiz penduline (*Remiz pendulinus*)

Un migrateur en halte est entendu le 21-10 dans la roselière A d'Harchies.

© Yves Fagniart

# Espèces férales

Cette rubrique reprend l'ensemble des espèces férales, exotiques ou échappées de captivité qui ont fréquenté les marais, sans y nidifier.

## Cygne noir (*Cygnus atratus*)

Trois individus sont observés ensemble le 14-10 sur l'étang A d'Harchies.

## Bernache nonnette (*Branta leucopsis*)

Déjà présente depuis septembre 2016, cette petite bernache voit son effectif local se renforcer au gré des arrivages. Ce sont finalement 185 (le 03-02) et 225 individus (le 19-02) qui prennent régulièrement leur gagnage dans les prairies B d'Harchies en première période hivernale. Par la suite, cette concentration se réduit inexorablement pour atteindre de 1 à 2 oiseaux qui sont irrégulièrement notés du 11-03 au 09-05.

Après environ 3 mois ½ d'absence, les 10 premières sont de retour le 28-08. Cette fois encore, ce groupe s'étoffe progressivement : 38 ind. le 27-08, 74 le 08-10, 148 le 28-10 et 170 le 30-10. En novembre et décembre, cette population fluctue faiblement entre 174 et 192 exemplaires. Serrés les uns aux autres lorsqu'ils

picorent les prairies en quête de nourriture, il n'est pas évident de compter fidèlement ces ansériformes.

Bien que raisonnablement considérées comme "exotiques", ces bernaches n'en suivent pas moins un cycle naturel. Elles désertent le site en pleine période de reproduction, y reviennent ensuite petit à petit et s'y concentrent aux périodes les plus froides. Leur statut précis ne semble décidément pas si évident à cerner.

## Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*)

Un oiseau esseulé stationne les 26 et 27-07 sur l'étang B d'Harchies.

## Erismature rousse (*Oxyura jamaicensis*)

Un individu est observé à une 10$^{aine}$ de reprises en plein cœur de l'hiver du 01-01 au 12-02 puis des isolés le sont les 10-07 et 19-10.

## Canard mandarin (*Aix galericulata*)

Originaire d'Asie, cette espèce exotique est plus présente qu'à l'accoutumée. Après 6 individus le 07-08, le court séjour de deux d'entre eux se termine de manière macabre par la découverte du cadavre de l'un d'eux le 11-08. Par la suite,

1 ♀ est souvent notée du 03-09 au 01-10 puis 1 ♂ jusqu'à la fin de l'année, mais de plus en plus irrégulièrement.

## Canard des Bahamas (*Anas bahamensis*)

Un individu est observé le 21-09 sur l'étang A d'Harchies.

## Canard à bec rouge (*Anas erythrorhyncha*)

Un individu fréquente brièvement les marais du 20 au 22-09, d'abord l'étang A d'Harchies puis Hensies.

## Pélican à lunettes (*Pelecanus conspicillatus*)

Cet échappé de captivité est présent du 02-08 du 16-08 sur divers étangs du site.







## Buse de Harris (*Parabuteo unicinctus*)

Ce possible rapace est découvert le 09-04, alors qu'il cercle assez haut.

© Yves Fagniart

# Liste récapitulative des espèces observées dans les Marais d'Harchies (1964 - 2017)

Ce ne sont pas moins de 279 espèces, 8 sous-espèces, 26 espèces férales, exotiques ou échappées qui ont été observées dans les Marais d'Harchies depuis 1964. La liste récapitulative qui suit est basée sur les données personnelles de Marius Loison , Dirk & Luc Verroken, ainsi que sur deux synthèses plus vastes, relatives à l'ensemble du Hainaut Occidental, rédigées par Hugues Dufourny et Mathieu Derume (mise à jour).

Pour compléter ce travail, les données du portail d'encodage « observations.be » ont été intégrées à partir de 2004.

Adaptation du statut de ces espèces

Les espèces très rares ou accidentelles sont indiquées en caractères gras (rouge). Les espèces rares ou très irrégulières sont notées en italique (rouge). A titre d'exemple, la *Mésange huppée* bien que commune en Belgique est moins observée que le Bihoreau gris dans les Marais d'Harchies qui est une espèce **rare** en Belgique.

Dans certains cas, il n'a pas été possible de restreindre une espèce à un statut précis, afin de ne pas se limiter à une interprétation qui serait par trop subjective.

Bibliographie

DUFOURNY, H. (2000) : Liste complète des oiseaux observés en Hainaut Occidental – période 1964 à 2000. *Le Guignard (rapport ornithologique du Hainaut Occidental) 2000* : 90 – 98.

DUFOURNY, H. (2001) : Liste des espèces échappées de captivité en Hainaut Occidental - période 1984 à 2000. *Le Guignard (rapport ornithologique du Hainaut Occidental) 2001* : 80-82.

DERUME, M. (2003-2004) : Nouvelle liste des oiseaux observés en Hainaut Occidental. *Le Guignard (rapport ornithologique du Hainaut Occidental) 2003-2004* : 72 – 80.

| | Espèces | Nom scientifique |
|---|---|---|
| EXO | Dendrocygne fauve | Dendrocygna bicolor |
| | **Bernache à cou roux** | Branta ruficollis |
| | Bernache du Canada | Branta canadensis |
| | Bernache nonnette | Branta leucopsis |
| EXO | Bernache de Hutchins | Branta hutchinsii |
| EXO | Oie à tête barrée | Anser indicus |
| | Oie cendrée | Anser anser |
| | **Bernache cravant** | Branta bernicla |
| | *Oie des moissons de la toundra* | Anser serrirostris |
| | Oie rieuse | Anser albifrons |
| EXO | Cygne noir | Cygnus atratus |
| | Cygne tuberculé | Cygnus olor |
| | Cygne de Bewick | Cygnus columbianus bewick |
| | *Cygne chanteur* | Cygnus cygnus |
| EXO | Ouettte  de Magellan | Chloephaga picta |
| | Ouette d'Egypte | Alopochen aegyptiacus |
| | Tadorne de Belon | Tadorna tadorna |
| EXO | Tadorne casarca | Tadorna ferruginea |
| EXO | Canard mandarin | Aix galericulata |
| EXO | Canard à crinière | Chenonetta jubata |
| EXO | Canard à collier | callonetta leucophrys |
| | Sarcelle d'été | Anas querquedula |
| EXO | Sarcelle cannelle | Spatula cyanoptera |
| | Canard souchet | Anas clypeata |
| | Canard chipeau | Anas strepera |
| | Canard siffleur | Mareca penelope |
| EXO | Canard siffleur du Chili | Mareca sibilatrix |
| | Canard colvert | Anas platyrhynchos |
| EXO | Canard des Bahamas | Anas bahamensis |
| EXO | Canard à bec rouge | Anas erythrofhyncha |
| | Canard pilet | Anas acuta |

| | Espèces | Nom scientifique |
|---|---|---|
| | Sarcelle d'hiver | Anas crecca |
| | **Sarcelle à ailes vertes** | Anas carolinensis |
| EXO | Sarcelle tachetée | Anas flavirostris |
| | *Nette rousse* | Netta rufina |
| | Fuligule milouin | Aythya ferina |
| | *Fuligule nyroca* | Aythya nyroca |
| | **Fuligule à bec cerclé** | Aythya collaris |
| | Fuligule morillon | Aythya fuligula |
| | Fuligule milouinan | Aythya marila |
| | *Eider à duvet* | Somateria mollissima |
| | **Macreuse brune** | Melanitta fusca |
| | *Macreuse noire* | Melanitta nigra |
| | **Harelde boréale** | Clangula hyemalis |
| | Garrot à oeil d'or | Bucephala clangula |
| | **Garrot d'Islande** | Bucephala islandica |
| | Harle piette | Mergellus albellus |
| | Harle bièvre | Mergus merganser |
| | *Harle huppé* | Mergus serrator |
| EXO | Érismature rousse | Oxyura jamaicensis |
| | Perdrix grise | Perdix perdix |
| ESC | Perdrix rouge | |
| | *Caille des blés* | Coturnix coturnix |
| EXO | Faisan vénéré | Syrmaticus reevesii |
| | Faisan de Colchide | Phasianus colchicus |
| EXO | Faisan doré | Chrysolophus pictus |
| | *Plongeon catmarin* | Gavia stellata |
| | **Plongeon arctique** | Gavia arctica |
| | **Plongeon imbrin** | Gavia immer |
| | Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis |
| | *Grèbe jougris* | Podiceps grisegena |

| | Espèces | Nom scientifique |
|---|---|---|
| | Grèbe huppé | Podiceps cristatus |
| | *Grèbe esclavon* | Podiceps auritus |
| | Grèbe à cou noir | Podiceps nigricollis |
| EXO | Tantale ibis | Mycteria ibis |
| | *Cigogne noire* | Ciconia nigra |
| | Cigogne blanche | Ciconia ciconia |
| | Ibis sacré | Threskiomis aethiopicus |
| | **Ibis falcinelle** | Plegadis falcinellus |
| EXO | Ibis de Ridgway | Plegadis ridgwayi |
| | Spatule blanche | Platalea leucorodia |
| | Butor étoilé | Botaurus stellaris |
| | *Blongios nain* | Ixobrychus minutus |
| | Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax |
| | **Crabier chevelu** | Ardeola ralloides |
| | Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis |
| | Héron cendré | Ardea cinerea |
| | *Héron pourpré* | Ardea purpurea |
| | Grande Aigrette | Ardea alba |
| | Aigrette garzette | Egretta garzetta |
| | **Pélican frisé** | Pelecanus crispus |
| EXO | Pélican à lunettes | Pelecanus conspicillatus |
| | Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo |
| ssp | *Grand Cormoran atlantique* | Phalacrocorax carbo carbo |
| | Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus |
| | Bondrée apivore | Pernis apivorus |
| | **Elanion Blanc** | Elanus caeruleus |
| | *Circaète Jean-le-Blanc* | Circaetus gallicus |
| | **Aigle botté** | Hieraaetus pennatus |
| | **Aigle criard** | Aquila clanga |
| | **Aigle de Bonelli** | Aquila fasciata |

| | Espèces | Nom scientifique |
|---|---|---|
| | Épervier d'Europe | Accipiter nisus |
| | Autour des palombes | Accipiter gentilis |
| | Busard des roseaux | Circus aeruginosus |
| | Busard Saint-Martin | Circus cyaneus |
| | **Busard pâle** | Circus macrourus |
| | *Busard cendré* | Circus pygargus |
| | **Milan royal** | Milvus milvus |
| | *Milan noir* | Milvus migrans |
| | *Pygargue à queue blanche* | Haliaeetus albicilla |
| | Buse variable | Buteo buteo |
| | *Buse pattue* | Buteo lagopus |
| | Râle d'eau | Rallus aquaticus |
| | **Marouette poussin** | Porzana parva |
| | **Marouette de Baillon** | Porzana pusilla |
| | *Marouette ponctuée* | Porzana porzana |
| | Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus |
| | Foulque macroule | Fulica atra |
| | *Grue cendrée* | Grus grus |
| | **Huîtrier pie** | Haematopus ostralegus |
| | *Échasse blanche* | Himantopus himantopus |
| | *Avocette élégante* | Recurvirostra avosetta |
| | Vanneau huppé | Vanellus vanellus |
| | *Pluvier doré* | Pluvialis apricaria |
| | *Pluvier argenté* | Pluvialis squatarola |
| | Grand gravelot | Charadrius hiaticula |
| | Petit gravelot | Charadrius dubius |
| | **Gravelot à collier interrompu** | Charadrius alexandrinus |
| | Courlis corlieu | Numenius phaeopus |
| | Courlis cendré | Numenius arquata |
| | *Barge rousse* | Limosa lapponica |

| | Espèces | Nom scientifique |
|---|---|---|
| | Barge à queue noire | Limosa limosa |
| | **Tournepierre à collier** | Arenaria interpres |
| | **Bécasseau maubèche** | Calidris canutus |
| | Combattant varié | Philomachus pugnax |
| | **Bécasseau cocorli** | Calidris ferruginea |
| | **Bécasseau de Temminck** | Calidris temminckii |
| | **Bécasseau sanderling** | Calidris alba |
| | Bécasseau variable | Calidris alpina |
| | *Bécasseau minute* | Calidris minuta |
| | **Bécasseau tacheté** | Calidris melanotos |
| | Bécasse des bois | Scolopax rusticola |
| | Bécassine sourde | Lymnocryptes minimus |
| | Bécassine des marais | Gallinago gallinago |
| | **Phalarope à bec étroit** | Phalaropus lobatus |
| | **Phalarope à bec large** | Phalaropus fulicarius |
| | Chevalier guignette | Actitis hypoleucos |
| | Chevalier cul-blanc | Tringa ochropus |
| | Chevalier gambette | Tringa totanus |
| | **Chevalier stagnatile** | Tringa stagnatilis |
| | Chevalier sylvain | Tringa glareola |
| | Chevalier arlequin | Tringa erythropus |
| | Chevalier aboyeur | Tringa nebularia |
| | **Mouette tridactyle** | Rissa tridactyla |
| | Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus |
| | Mouette pygmée | Hydrocoloeus minutus |
| | Mouette mélanocéphale | Ichthyaetus melanocephalus |
| | Goéland cendré | Larus canus |
| | *Goéland marin* | Larus marinus |
| | *Goéland bourgmestre* | Larus hyperboreus |
| | **Goéland à ailes blanches** | Larus glaucoides |

| | Espèces | Nom scientifique |
|---|---|---|
| | Goéland argenté | Larus argentatus |
| ssp | **Goéland argenté de Scandinavie** | Larus argentatus argentatus |
| | Goéland pontique | Larus cachinnans |
| | Goéland leucophée | Larus michahellis |
| | Goéland brun | Larus fuscus |
| ssp | **Goéland brun de scandinavie** | Larus fuscus intermedius |
| | *Sterne caspienne* | Hydroprogne caspia |
| | **Sterne caugek** | Thalasseus sandvicensis |
| | **Sterne hansel** | Gelochelidon nilotica |
| | *Sterne naine* | Sternula albifrons |
| | Sterne pierregarin | Sterna hirundo |
| | *Sterne arctique* | Sterna paradisaea |
| | *Guifette moustac* | Chlidonias hybrida |
| | *Guifette leucoptère* | Chlidonias leucopterus |
| | Guifette noire | Chlidonias niger |
| | **Labbe pomarin** | Stercorarius pomarinus |
| | **Labbe à longue queue** | Stercorarius longicaudus |
| | **Labbe parasite** | Stercorarius parasiticus |
| | Pigeon colombin | Columba oenas |
| | Pigeon ramier | Columba palumbus |
| | Tourterelle des bois | Streptopelia turtur |
| | Tourterelle turque | Streptopelia decaocto |
| | Pigeon biset « domestique » | Columba livia |
| | Coucou gris | Cuculus canorus |
| | Effraie des clochers | Tyto alba |
| | Chouette hulotte | Strix aluco |
| | Chevêche d'Athéna | Athene noctua |
| | Hibou moyen-duc | Asio otus |
| | *Grand-duc d'Europe* | Bubo bubo |
| | *Hibou des marais* | Asio flammeus |

| | Espèces | Nom scientifique |
|---|---|---|
| | **Engoulevent d'Europe** | Caprimulgus europaeus |
| | Martinet noir | Apus apus |
| | Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis |
| | **Guêpier d'Europe** | Merops apiaster |
| | **Huppe fasciée** | Upupa epops |
| | *Torcol fourmilier* | Jynx torquilla |
| | Pic épeichette | Dendrocopos minor |
| | Pic mar | Dendrocopos medius |
| | Pic épeiche | Dendrocopos major |
| | Pic noir | Dryocopus martius |
| | Pic vert | Picus viridis |
| | Faucon crécerelle | Falco tinnunculus |
| | *Faucon kobez* | Falco vespertinus |
| | Faucon émerillon | Falco columbarius |
| | Faucon hobereau | Falco subbuteo |
| | Faucon pèlerin | Falco peregrinus |
| | **Faucon pèlerin ssp « calidis"** | Falco peregrinus calidis |
| EXO | Perruche à huppe jaune | Nymphicus hollandicus |
| EXO | Perruche à collier | Psittacula krameri |
| EXO | Perroquet gris du Gabon | Psitttacus erithacus |
| | **Pie-grièche écorcheur** | Lanius collurio |
| | **Pie-grièche à tête rousse** | Lanius senator |
| | *Pie-grièche grise* | Lanius excubitor |
| | Loriot d'Europe | Oriolus oriolus |
| | Geai des chênes | Garrulus glandarius |
| | Pie bavarde | Pica pica |
| | Corbeau freux | Corvus frugilegus |
| | Corneille noire | Corvus corone |
| | **Corneille mantelée** | Corvus cornix |
| | **Grand Corbeau** | Corvus corax |

| | Espèces | Nom scientifique |
|---|---|---|
| | Choucas des tours | Coloeus monedula |
| ssp | **Choucas des tours nordique** | Coloeus monedula monedula |
| ssp | **Choucas des tours oriental** | Corvus monedula soemmeringii |
| | *Jaseur boréal* | Bombycilla garrulus |
| | Mésange nonnette | Poecile palustris |
| | Mésange boréale | Poecile montanus |
| | Mésange noire | Periparus ater |
| | *Mésange huppée* | Lophophanes cristatus |
| | Mésange charbonnière | Parus major |
| | Mésange bleue | Cyanistes caeruleus |
| | *Rémiz penduline* | Remiz pendulinus |
| | *Panure à moustaches* | Panurus biarmicus |
| | Alouette lulu | Lullula arborea |
| | Alouette des champs | Alauda arvensis |
| | Hirondelle de rivage | Riparia riparia |
| | Hirondelle rustique | Hirundo rustica |
| | Hirondelle de fenêtre | Delichon urbicum |
| | Bouscarle de Cetti | Cettia cetti |
| | Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus |
| | *Mésange à longue queue caudatus* | Aegithalos caudatus caudatus |
| | Pouillot fitis | Phylloscopus trochilus |
| | Pouillot véloce | Phylloscopus collybita |
| ssp | **Pouillot véloce sibérien** | Phylloscopus collybita tristis |
| | *Pouillot siffleur* | Phylloscopus sibilatrix |
| | **Pouillot à grands sourcils** | Phylloscopus inornatus |
| | *Rousserolle turdoïde* | Acrocephalus arundinaceus |
| | **Phragmite aquatique** | Acrocephalus paludicola |
| | Phragmite des joncs | Acrocephalus schoenobaenus |
| | Rousserolle effarvatte | Acrocephalus scirpaceus |
| | Rousserolle verderolle | Acrocephalus palustris |

| | Espèces | Nom scientifique |
|---|---|---|
| | **Rousserolle des buissons** | Acrocephalus dumetorum |
| | Hypolaïs ictérine | Hippolais icterina |
| | *Hypolaïs polyglotte* | Hippolais polyglotta |
| | Locustelle tachetée | Locustella naevia |
| | **Locustelle fluviatile** | Locustella fluviatilis |
| | *Locustelle luscinioïde* | Locustella luscinioides |
| | Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla |
| | Fauvette des jardins | Sylvia borin |
| | Fauvette babillarde | Sylvia curruca |
| | Fauvette grisette | Sylvia communis |
| | Roitelet à triple bandeau | Regulus ignicapilla |
| | Roitelet huppé | Regulus regulus |
| | Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes |
| | Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla |
| | **Grimpereau des bois** | Certhia familiaris |
| | Sittelle torchepot | Sitta europaea |
| | Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris |
| EXO | Étourneau métallique à oreillons bleus | Lamprotornis chalybaeus |
| | Merle à plastron | Turdus torquatus |
| | Merle noir | Turdus merula |
| | Grive litorne | Turdus pilaris |
| | Grive mauvis | Turdus iliacus |
| | Grive musicienne | Turdus philomelos |
| | Grive draine | Turdus viscivorus |
| | Rougegorge familier | Erithacus rubecula |
| | Gorgebleue à miroir blanc | Luscinia svecica cyanecula |
| | **Gorgebleue à miroir roux** | Luscinia svecica svecica |
| | Rossignol philomèle | Luscinia megarhynchos |
| | Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros |
| | *Rougequeue à front blanc* | Phoenicurus phoenicurus |

| | Espèces | Nom scientifique |
|---|---|---|
| | *Tarier des prés* | Saxicola rubetra |
| | Tarier pâtre | Saxicola rubicola |
| | **Tarier pâtre oriental** | Saxicola torquata maura |
| | Traquet motteux | Oenanthe oenanthe |
| | *Gobemouche gris* | Muscicapa striata |
| | **Gobemouche noir** | Ficedula hypoleuca |
| | Moineau domestique | Passer domesticus |
| | Moineau friquet | Passer montanus |
| | **Pipit à gorge rousse** | Anthus cervinus |
| | Accenteur mouchet | Prunella modularis |
| EXO | Astrild ondulé | Estrilda astrild |
| | Bergeronnette printanière | Motacilla flava |
| | *Bergeronnette printanière nordique* | Motacilla flava thunbergi |
| | **Bergeronnette citrine** | Motacilla citreola |
| | Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea |
| | Bergeronnette grise | Motacilla alba |
| ssp | *Bergeronnette de yarrell* | Motacilla alba yarrellii |
| | **Pipit rousseline** | Anthus campestris |
| | Pipit farlouse | Anthus pratensis |
| | Pipit des arbres | Anthus trivialis |
| | Pipit spioncelle | Anthus spinoletta |
| | Pinson des arbres | Fringilla coelebs |
| | Pinson du Nord | Fringilla montifringilla |
| | *Serin cini* | Serinus serinus |
| | Verdier d'Europe | Carduelis chloris |
| | Tarin des aulnes | Carduelis spinus |
| | Chardonneret élégant | Carduelis carduelis |
| | Sizerin cabaret | Acanthes cabaret |
| | Sizerin flammé | Carduelis flammea |
| | **Linotte à bec jaune** | Carduelis flavirostris |

| | Espèces | Nom scientifique |
|---|---|---|
| | Linotte mélodieuse | Carduelis cannabina |
| | *Bec-croisé des sapins* | Loxia curvirostra |
| | Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula |
| ssp | **Bouvreuil pivoine nordique** | Pyrrhula pyrrhula pyrrhula |
| | Gros-bec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes |
| | **Bruant proyer** | Emberiza calandra |
| | Bruant jaune | Emberiza citrinella |
| | **Bruant ortolan** | Emberiza hortulana |
| | **Bruant nain** | Emberiza pusilla |
| | Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus |
| | **Bruant à calotte blanche** | Emberiza leucocephalos |

# Contributeurs à ce monitoring

Le groupe de travail « Marais d'Harchies » de la section Natagora AVES Ms-Ti (sous l'égide du Comité de Gestion)

Cuvelier Eric, Descamps Marc, Dufour Vincent, Fabry Matthieu, Jenard Philippe, Malengreau Alain, Mari Sabrina, Picard Nathalie, Stocman François, Vandendriessche Gwenaelle, Vanderstichele Françoise, Verroken Dirk, Verroken Luc, Zanon Martine & Joseph et Zante Cathy.

Un remerciement particulièrement appuyé à Vincent Leirens et Jérémy Simar pour leurs observations personnelles qui sont largement intégrées à ce rapport.

Les observateurs dont les données ont été encodées via www.observations.be

E. Ackaert, P. Allegaert, M. André, C. Andy, G. Andy, B. Augustijns, L. Baekelandt, W. Bellens, J. Bergmans, P. Blockx, P. Blondé, K. Boey, P. Bonmariage, M. Bonnet, S. Boone, D. Botteldoorn, V. Bouquelle, B. Broos, K. Bullen, B. Calis, M. Camps, E. Callebaut, D. Chalon, G. Chapelle, N. Christiaen, G. Clerbaux, B. Collet, B. Cottele, J. Coyette, A. Crusiaux, P. Dawagne, T. Debaere, M. Debouver, H. Debruyne, L. Degraer, B. De Keersmaecker, A. Delier, J. Denaeghel, C. Deneufbourg, A. Denis, V. Denuit, P. Deruyver, C. Devos, Luc De Wit, K. De Witte, S. d'Hoop, F. Dormal, O. Dupont, P. Dury, N. El Takriti, W. Faveyts, C. Fery, M. Flasse, J. Fléron, D. Fosselard, R. Fromont, R. Gailly, M. Gérard, M. Gerits, P. Ghysel, M. Gillard, S. Glotz, B. Gondry, D. Gregoire, E. Grupping, M. Guelton, S. Hauptmann, M. Henry, P. Heylens, P. Heymans, S. Hotton, C. Jacobs, P. Janssens, N. Joly, M. Jonckers, T. Jussen, JM. Kerkhove, L. Kestemont, M. Kyametis, C. Larbalestrier, A. Lanquaert, JJ. Lebrun, J. Lecomte, M. Lefranc, T. Lefevre, PM. Marchand, F. Martens, D. Mary, B. Mertens, M. Meunier, J. Michielssen, B. Miserez, K. Morren, C. Nopelaire, S. Ottevaere, G. Paggen, JY. Paquet, J. Paternostre, Y. Pieters, LM. Pigneur, I. Piryns, J. Preud'homme, G. Rijmenans, W. Roelant, C. Rondeau, F. Ruysschaert, G. Schmitz, JB. Schuermans, J. Seynaeve, Sin & Danny, L. Sonnet, D. Stiennon, P. Stroot, F. Taburiaux, C. Terseleer Lillo, V. Thelen, E. Tinti, Y. Tremont, K. Tuytens, M. Van Acker, P. Van Daele, F. Vandenbussche, D. Van Der Elst, F. Vandorpe, F. Vanhove, N. Van Overmeeren, C. Verriest, L. Verstraete, C. Victor, L. Vilain et J. Wauters.

D'ores et déjà, nous adressons nos excuses auprès de ceux que nous aurions malencontreusement oubliés.

# Remerciements

Les membres du Comité de Gestion pour la confiance témoignée et leur volonté d'ouverture.

Les naturalistes énumérés ci-dessus, bénévoles de surcroît pour la plupart, sans lesquels ce travail volumineux ne pourrait être.

Nous tenons à remercier chaleureusement Yves Fagniart, aquarelliste de renom, qui n'a pas hésité à mettre à disposition ses réalisations pour illustrer ce rapport. Pris sur le vif au sein même des Marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul, ces croquis et dessins apportent une indéniable finesse, artistique et touchante à la fois.

Un tout grand merci à Nicole Joly, photographe respectueuse des Marais d'Harchies pour qui les espèces n'ont plus aucun secret et dont les clichés patiemment réalisés égaillent ce rapport mais, plus encore, rehaussent sa qualité finale.

Nos épouses respectives pour leur grande patience vis-à-vis de notre passion si dévorante.

Auteurs : Philippe Jenard & Alain Malengreau

# Index des noms français


Accenteur mouchet 37
Aigrette garzette 20
Alouette des champs 36
Alouette lulu 64
Autour des palombes 58
Avocette élégante 60
Balbuzard pêcheur 58
Barge à queue noire 62
Bécasseau minute 73
Bécasseau variable 60
Bécasse des bois 30
Bécassine des marais 62
Bécassine sourde 73
Bec-croisé des sapins 69
Bergeronnette des ruisseaux 65
Bergeronnette grise 37
Bergeronnette printanière 37
Bernache à cou roux 71
Bernache du Canada 5
Bernache nonnette 76
Bihoreau gris 18
Blongios nain 18
Bondrée apivore 25
Bouscarle de Cetti 43
Bouvreuil pivoine 50
Bruant des roseaux 51
Bruant jaune 51
Busard des roseaux 24
Busard Saint-Martin 58
Buse de Harris 78
Buse variable 25
Butor étoilé 17
Canard à bec rouge 78
Canard chipeau 8
Canard Colvert 7
Canard des Bahamas 78
Canard mandarin 77
Canard pilet 55
Canard siffleur 55
Canard souchet 9
Chardonneret élégant 68
Chevalier aboyeur 61
Chevalier arlequin 61
Chevalier culblanc 60
Chevalier gambette 61
Chevalier guignette 61
Chevalier sylvain 60
Chevêche d'Athéna 34
Choucas des tours 48
Chouette hulotte 33
Cigogne blanche 57
Cigogne noire 73
Combattant varié 62
Corbeau freux 68
Corneille noire 49
Coucou gris 33
Courlis cendré 62
Courlis corlieu 62
Crabier chevelu 71
Cygne de Bewick 53
Cygne tuberculé 4
Cygne noir 76
Echasse blanche 73
Epervier d'Europe 26
Erismature rousse 77
Etourneau sansonnet 49
Faisan de Colchide 12
Faucon crécerelle 58
Faucon émerillon 59
Faucon hobereau 26
Faucon pèlerin 59
Fauvette à tête noire 40
Fauvette babillarde 42
Fauvette des jardins 40
Fauvette grisette 41
Foulque macroule 28
Fuligule milouin 10
Fuligule morillon 11
Fuligule nyroca 56
Gallinule poule d'eau 27
Garrot à oeil d'or 56
Geai des chênes 48
Gobemouche gris 67
Goéland argenté 62
Goéland brun 63
Goéland cendré 30
Goéland leucophée 63
Goéland pontique 63
Gorgebleue à miroir Blanc 38
Grand Cormoran 16
Grande Aigrette 21
Grand gravelot 60
Grèbe à cou noir 12

Grèbe castagneux 13
Grèbe huppé 15
Grimpereau des jardins 46
Grive draine 39
Grive litorne 67
Grive mauvis 66
Grive musicienne 39
Grosbec casse-noyaux 69
Guifette moustac 73
Guifette noire 63
Harle bièvre 57
Harle piette 56
Héron cendré 22
Héron garde-boeufs 19
Héron pourpré 57
Hibou des marais 73
Hibou grand duc 73
Hibou moyen-duc 33
Hirondelle de fenêtre 36
Hirondelle de rivage 65
Hirondelle rustique 36
Huîtrier pie 59
Hypolaïs ictérine 44
Hypolaïs polyglotte 44
Ibis falcinelle 72
Linotte mélodieuse 68
Locustelle luscinioïde 44
Locustelle tachetée 44
Loriot d'Europe 49
Marouette ponctuée 59
Martinet noir 64
Martin-pêcheur 34
Merle à plastron 74
Merle noir 40
Mésange à longue queue 47
Mésange bleue 46
Mésange boréale 47
Mésange charbonnière 46
Mésange huppée 67
Mésange noire 67
Mésange nonnette 47
Milan noir 24
Milan Royal 73
Moineau domestique 50
Moineau friquet 50
Mouette mélanocéphale 30
Mouette pygmée 63
Mouette rieuse 30
Nette rousse 56
Oie cendrée 5
Oie rieuse 54
Ouette d'Egypte 6
Panure à moustaches 67
Pélican à lunettes 78
Perdrix grise 12
Petit gravelot 60
Phragmite des joncs 42
Pic épeiche 35
Pic épeichette 36
Pic vert 35
Pic mar 64
Pic noir 64
Pie bavarde 48
Pigeon colombin 32
Pigeon ramier 32
Pinson des arbres 50
Pinson du nord 68
Pipit des arbres 37
Pipit farlouse 65
Pipit rousseline 74
Pipit spioncelle 65
Pouillot à grands sourcils 74
Pouillot fitis 45
Pouillot véloce 45
Râle d'eau 26
Rémiz penduline 74
Roitelet huppé 46
Roitelet triple-bandeau 67
Rossignol philomèle 38
Rougegorge familier 38
Rougequeue à front Blanc 65
Rougequeue noir 39
Rousserolle effarvatte 43
Rousserolle verderolle 44
Sarcelle d'été 10
Sarcelle d'hiver 9
Serin cini 69
Sitelle torchepot 47
Sizerin boréal 68
Sizerin cabaret 68
Sizerin flammé 68
Sterne Pierregarin 31
Sterne naine 73
Spatule blanche 23
Tadorne casarca 77
Tadorne de Belon 54
Tarier des prés 66
Tarier pâtre 66
Tarin des aulnes 69

Torcol fourmilier 73
Tourterelle des bois 32
Tourterelle Turque 32
Troglodyte mignon 46
Vanneau huppé 29
Verdier d’Europe 50